

Mat-1.4334 peruskurssit KP3-II

L 3

Heikki Apiola

heikki.apiola@hut.fi

3. marraskuuta 2006

1.3 Vektoriyhtälöt

Avainkäsitteet: Vektorien **lineaarikombinaatio**, **virittävä joukko**, **viritelmä**

Vektori: $\vec{v} = [v_1, \dots, v_n]^T \in \mathbb{R}^n$

(Usein ajatellaan vektori pystyvektorina, siksi tuo T .)

Lineaarikombinaatiot:

Olkoon annettu vektorit $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$ ja skalaarit c_1, c_2, \dots, c_p . Vektori \mathbf{y} :

$$\mathbf{y} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_p \mathbf{v}_p$$

on vektorien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ lineaarikombinaatio, (paino)kertoimin c_1, c_2, \dots, c_p .

ESIM: Olkoot $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ja $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$. Esitä piirroksen avulla kukin alla oleva vektori \mathbf{v}_1 :n ja \mathbf{v}_2 :n lineaarikombinaationa

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \end{bmatrix}$$

ESIM:

Olkoot $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 14 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}$, ja $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix}$.

Selvitää, onko \mathbf{b} vektorien \mathbf{a}_1 , \mathbf{a}_2 ja \mathbf{a}_3 lineaarikombinaatio.

Ratkaisu: Vektori \mathbf{b} on vektorien \mathbf{a}_1 , \mathbf{a}_2 , ja \mathbf{a}_3 lineaarikombinaatio, jos löydetään luvut x_1, x_2, x_3 siten että

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{b}.$$

Vektoriyhtälö (*):

\iff

$$\begin{aligned} x_1 &+ 4x_2 &+ 3x_3 &= -1 \\ &2x_2 &+ 6x_3 &= 8 \\ 3x_1 &+ 14x_2 &+ 10x_3 &= -5 \end{aligned}$$

Liitännäismatriisi:

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 4 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 6 & 8 \\ 3 & 14 & 10 & -5 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \implies \begin{aligned} x_1 &= \underline{\hspace{2cm}} \\ x_2 &= \underline{\hspace{2cm}} \\ x_3 &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

Siis:

Ratkaisu vektoriyhtälölle

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{b}$$

saatiin ratkaisemalla lineaarinen systeemi, jonka liitännäismatriisi:

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 4 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 6 & 8 \\ 3 & 14 & 10 & -5 \end{array} \right]$$

↑ ↑ ↑ ↑
 $\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{b}$

Riviajattelu vs. sarakeajattelu

Yllä oleva lasku (yhtälön vasen puoli) voidaan ilmaista myös näin:

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = A \mathbf{x},$$

missä

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}.$$

Vektorimuoto vs. matriisimuoto yleisesti

Vektoriyhtälöllä

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

on samat ratkaisut kuin lineaarisella systeemillä, jonka liitännäismatriisi on

$$\left[\begin{array}{ccccc} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b} \end{array} \right].$$

Erityisesti \mathbf{b} voidaan lausua lineaarikombinaationa vektoreista $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$

jos ja vain jos

lineaarisella systeemillä, jonka liitännäismatriisi on yllä, on ratkaisuja

Määritelmä: Vektorijoukon viritelmä ("span")

Olkoot $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$:n vektoreita.

$\text{sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p\}$ = vektorien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ kaikkien lineaarikombinaatioiden joukko.

Toisin sanoen: $\text{sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p\}$ on kaikkien vektorien joukko, jotka voidaan lausua muodossa

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \cdots + x_p\mathbf{v}_p$$


missä x_1, x_2, \dots, x_p ovat skalaareja.

ESIMERKKI: Olkoon $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ja $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$.

- (a) Määritä jokin vektori joukossa $\text{sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

(b) Luonnehdi $\text{sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ geometrisesti.


ESIMERKKI: Merkitse \mathbf{u} , \mathbf{v} , $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ ja $3\mathbf{u}+4\mathbf{v}$ oheiseen kuvaan.



\mathbf{u} , \mathbf{v} , $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ ja $3\mathbf{u}+4\mathbf{v}$

$\text{sp}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ on muotoa $x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v}$ olevien vektorien joukko, tässä O :n kautta kulkeva taso.


Virittäviä joukkoja \mathbb{R}^3 :ssa



v_2 on v_1 :n monikerta

$$\text{sp}\{v_1, v_2\} = \text{sp}\{v_1\} = \text{sp}\{v_2\}$$

(origon kautta kulkeva suora)



\mathbf{v}_2 ei ole \mathbf{v}_1 :n kerrannainen

$\text{sp}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} =$ origon kautta kulkeva taso

ESIMERKKI: Olkoon $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ ja $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}$. Matriisin A sarakevektorit virittävät tason. Onko \mathbf{b} tässä tasossa?

Ratkaisu:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}$$

Onko olemassa x_1 ja x_2 siten, että

Corresponding augmented matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 17 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 0 & -5 & -21 \\ 0 & 5 & 17 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 0 & -5 & -21 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

So \mathbf{b} is not in the plane spanned by the columns of A