
Johdatus todennäköisyyslaskentaan

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka

Klassinen todennäköisyys

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Permutaatiot ja variaatiot

Kombinaatiot ja binomikertoimet

Multinomikertoimet

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka: Mitä opimme? – 1/2

- Tarkastelemme tässä luvussa **klassisen todennäköisyyden määritelmään** liittyvien alkeistapahtumien lukumäärien laskemista **kombinatoriikan** avulla.
- Opimme kuinka **kombinatoriikan perusongelmat**, äärellisen joukon alkioiden muodostamien **jonojen, osajonojen ja osajoukkojen lukumäärien laskeminen**, voidaan ratkaista **kombinatoriikan peruseriaatteiden, yhteenlaskuperiaatteen ja kertolaskuperiaatteen**, avulla.

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka: Mitä opimme? – 2/2

- Opimme myös seuraavat käsitteet:
 - (i) Äärellisen joukon alkioiden *jonoja* kutsutaan alkioiden **permutaatioiksi**.
 - (ii) Äärellisen joukon alkioiden *osajonoja* kutsutaan alkioiden **variaatioiksi** tai **k -permutaatioiksi**.
 - (iii) Äärellisen joukon alkioiden *osajoukkoja* kutsutaan alkioiden **kombinaatioiksi**.
- Näemme miten kaikkien mahdollisten *permutaatioiden lukumäärä* voidaan ilmaista **kertomafunktion** avulla.
- Näemme miten kaikkien mahdollisten *kombinaatioiden lukumäärä* voidaan ilmaista **binomikertoimien** avulla.

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka: Esitiedot

- Esitiedot: ks. seuraavia lukuja:

Todennäköisyys ja sen määrittelemine

Todennäköisyyden peruslaskusäännöt

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka

>> Klassinen todennäköisyys

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Permutaatiot ja variaatiot

Kombinaatiot ja binomikertoimet

Multinomikertoimet

Klassinen todennäköisyys

Avainsanat

Klassinen todennäköisyys

Kombinatoriikka

Suotuisa alkeistapahtuma

Symmetriset alkeistapahtumat

Tapahtuma

Äärellinen otosavaruus

Klassinen todennäköisyys: Määritelmä

- Olkoon $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ äärellinen otosavaruus.
- Oletetaan, että

$$\Pr(s_i) = \frac{1}{n}, \text{ kaikille } i = 1, 2, \dots, n$$

- Tällöin sanomme, että *alkeistapahtumat* s_i ovat **symmetrisiä**.
- Tarkastellaan *tapahtumaa* $A \subset S$, johon kuuluu k alkeistapahtumaa, joita kutsutaan tapahtumalle A *suotuisiksi*.
- Tällöin tapahtuman A **klassinen todennäköisyys** on

$$\Pr(A) = \frac{k}{n}$$

Klassinen todennäköisyys: Kommentteja 1/3

- *Uhkapelit* muodostavat klassisen todennäköisyyden määritelmän tärkeimmän sovelluskohteen.
- Useimmissa uhkapeleissä peliin liittyvät *alkeistapahtumien on oltava symmetrisiä pelin sääntöjen mukaan*.
- Jos satunnaisilmiön alkeistapahtumat ovat symmetrisiä, erilaisten tapahtumien todennäköisyydet voidaan määrätä *päättelemällä* käyttämällä apuna *kombinatorisia laskutoimituksia*.
- *Todennäköisyyslaskenta sai alkunsa* eräiden uhkapelien voitonmahdollisuuksia koskeneista ongelmista 1600-luvulla.

Klassinen todennäköisyys: Kommentteja 2/3

- Pitääkö *oletus* alkeistapahtumien *symmetrisyydestä* paikkaansa myös *reaalimaailmassa*, on *empiirinen* kysymys.
- Jos satunnaisilmiöstä on *havaintoja*, voidaan *symmetria-oletusta* testata *tilastollisilla testeillä*.
- Otosavaruuteen ja sen tapahtumiin kuuluvien alkeistapahtumien *lukumäärien laskeminen* on usein epätriviaali tehtävä, jossa voidaan käyttää apuna *kombinatoriikkaa*.

Klassinen todennäköisyys: Kommentteja 3/3

- Klassisen todennäköisyyden määritelmä on liian *rajoittava* ollakseen käyttökelpoinen todennäköisyyden yleisenä määritelmänä:
 - (i) Määritelmä *ei anna* mahdollisuutta puhua todennäköisyyksistä sellaisissa tilanteissa, joissa satunnaisilmiöön liittyvän otosavaruuden alkeistapahtumat *eivät ole symmetrisiä*.
 - (ii) Määritelmä *ei anna* mahdollisuutta puhua *äärettömiin otosavaruuksiin* liittyvien tapahtumien todennäköisyyksistä.
- *Matemaattisesti* kelvollisen määritelmän todennäköisyydelle antavat ns. *Kolmogorovin aksioomat*.

Klassinen todennäköisyys

Esimerkki

- Heitetään noppaa.
- Tällöin otosavaruus on

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

- Oletetaan, että noppa on *virheetön* eli

$$\Pr(i) = \frac{1}{6}, \text{ kaikille } i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

- Olkoon tapahtuma

$$A = \{5, 6\} \subset S.$$

- Tapahtumalle A *suotuisien* alkeistapahtumien lukumäärä $k = 2$.
- Siten tapahtuman A todennäköisyys on

$$\Pr(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0.333$$

Joukon alkioden lukumäärän laskeminen ja kombinatoriikka

- Jos perusjoukko (otosavaruus) on kooltaan vähänkin isompi, perusjoukon ja sen osajoukkojen (tapahtumien) alkioden (alkeistapahtumien) *lukumäärien laskemisessa* tarvitaan apuna jotakin *järjestelmällistä* menetelmää.
- Järjestelmällisen menetelmän joukon alkioden lukumäärän laskemiseen tarjoaa **kombinatoriikaksi** kutsuttu matematiikan osa-alue.

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka

Klassinen todennäköisyys

>> Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Permutaatiot ja variaatiot

Kombinaatiot ja binomikertoimet

Multinomikertoimet

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Avainsanat

Jono

Joukko

Kertolaskuperiaate

Kombinatoriikan perusongelmat

Kombinatoriikan perusperiaatteet

Kombinatoriikka

Operaatio

Osajono

Osajoukko

Riippumattomat operaatiot

Toisensa poissulkevat operaatiot

Yhteenlaskuperiaate

Kombinatoriikan perusperiaatteet 1/2

- Kombinatoriikan kaavojen johtamiseen ja perustelemiseen tarvitaan usein vain kahta yksinkertaista periaatetta, joita sanotaan **kombinatoriikan perusperiaatteiksi**:
 - (1) **Yhteenlaskuperiaate**
 - (2) **Kertolaskuperiaate**

Kombinatoriikan perusperiaatteet 2/2

- Tarkastellaan **operaatioita** M ja N .
- Tehdään seuraavat oletukset:
 - (1) Operaatio M voidaan suorittaa m eri tavalla.
 - (2) Operaatio N voidaan suorittaa n eri tavalla.
- Operaatiot M ja N voidaan *yhdistää* uudeksi, **yhdistetyksi operaatioksi** seuraavilla tavoilla:
 - (i) ”Suoritetaan M tai N ”
 - (ii) ”Suoritetaan M ja N ”
- Kombinatoriikan perusperiaatteet liittyvät näiden kahden yhdistetyn operaation *suoritustapojen lukumäärien* laskemiseen.

Kombinatoriikan peruseriaatteet ja perusongelmat

Toisensa poissulkevat operaatiot ja yhteenlaskuperiaate

- Sanomme, että operaatiot M ja N ovat **toisensa poissulkevia**, jos operaatioita M ja N *ei voi* suorittaa yhtäaikaan eli samanaikaisesti.
- Olkoot operaatiot M ja N *toisensa poissulkevia*.
- Oletetaan lisäksi, että operaatio M voidaan suorittaa m eri tavalla ja operaatio N voidaan suorittaa n eri tavalla.
- Tällöin *yhdistetty operaatio*
 - (i) ”Suoritetaan M tai N ”
voidaan suorittaa $m + n$ eri tavalla.

Riippumattomat operaatiot ja kertolaskuperiaate


- Sanomme, että operaatiot M ja N ovat **riippumattomia**, jos se, mikä vaihtoehtoisista tavoista suorittaa operaatio M valitaan, *ei vaikuta* siihen, mikä vaihtoehtoisista tavoista suorittaa operaatio N valitaan ja kääntäen.
- Olkoot operaatiot M ja N *riippumattomia*.
- Oletetaan lisäksi, että operaatio M voidaan suorittaa m eri tavalla ja operaatio N voidaan suorittaa n eri tavalla.
- Tällöin *yhdistetty operaatio*
(ii) ”Suoritetaan M ja N ”
voidaan suorittaa $m \times n$ eri tavalla.

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Kombinatoriikan perusperiaatteet:

Esimerkki 1/3

- Kaupunkien X ja Y välillä on 2 suoraa lentoa.
- X :stä Y :hyn pääsee myös kaupungin Z kautta:
 - (i) Kaupunkien X ja Z välillä on 3 lentoa.
 - (ii) Kaupunkien Z ja Y välillä on 2 lentoa.
- Oletetaan lisäksi, että lentojen valinnat voidaan tehdä toisistaan *riippumatta*.
- *Kuinka monella eri tavalla voidaan lentää X :stä Y :hyn?*




Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Kombinatoriikan perusperiaatteet:

Esimerkki 2/3

- Koska lentojen valinnat voidaan tehdä toisistaan *riippumatta*, *Z:n* kautta tapahtuviin lentoihin voidaan soveltaa kombinatoriikan *kertolaskuperiaatetta*.
- Sen mukaan *X:stä Y:hyn* pääsee lentämään *Z:n* kautta
 $3 \times 2 = 6$
eri tavalla.




Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Kombinatoriikan perusperiaatteet:

Esimerkki 3/3

- Koska 2 suoraa lentoa X :stä Y :hyn ja 6 eri tapaa lentää X :stä Y :hyn Z :n kautta ovat *toisensa poissulkevia*, lentojen kokonaislukumäärä saadaan soveltamalla kombinatoriikan yhteenlaskuperiaatetta.
- Sen mukaan X :stä Y :hyn pääsee lentämään
 $2 + 6 = 8$
eri tavalla.



Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Kombinatoriikan perusongelmat 1/2

- Olkoon

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

äärellinen joukko, jonka (erilaisten) alkioiden lukumäärä on

$$n = n_S = n(S),$$

jossa $n_S = n(S)$ on *lukumääräfunktio*, joka kertoo joukon S (erilaisten) alkioiden lukumäärän.

- *Kombinatoriikan perusongelmat* liittyvät joukon S alkioiden muodostamien *osajonojen* ja *osajoukkojen* lukumäärien laskemiseen.

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Kombinatoriikan perusongelmat 2/2

- **Kombinatoriikan perusongelmat:**
 - (1a) **Kuinka monella erilaisella tavalla joukon S alkioita voidaan järjestää *jonoon*?**
 - (1b) **Kuinka monella erilaisella tavalla joukon S alkioista voidaan muodostaa k :n alkion *osajono*?**
 - (2) **Kuinka monella erilaisella tavalla joukon S alkioista voidaan muodostaa k :n alkion *osajoukko*?**

Joukko

- Palautetaan mieleen, että **joukko** on täysin määrätty, jos sen *alkiot* tunnetaan.
- Olkoot *äärellisen* joukon A (erilaiset) alkiot

$$a_1, a_2, \dots, a_n$$

- Tällöin merkitään

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Joukkojen samuus

- Joukot A ja B ovat **samat**, jos niissä on täsmälleen samat alkiot:

$$A = B,$$

jos ja vain jos

$$x \in A \Leftrightarrow x \in B.$$

Jono

- Palautetaan mieleen, että **jono** on täysin määrätty, jos sen *alkiot* ja niiden *järjestys* tunnetaan.

- Olkoon a jono, jonka i . alkio on

$$a_i, i = 1, 2, \dots, n$$

- Tällöin merkitään

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

- 1-numeroisten ei-negatiivisten kokonaislukujen muodostamia jonoja merkitään usein kirjoittamalla numerot peräkkäin ilman sulkumerkkejä ja pilkkuja kuten moninumeroisissa luvuissa.

Esimerkki:

$$6491 = (6, 4, 9, 1)$$

Jonojen samuus

- Jonot $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ja $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ ovat **samat**, jos niissä on samat alkiot samassa järjestyksessä:

$$a = b,$$

jos ja vain jos

$$a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

Joukko vs jono: Esimerkki

- *Joukot*

$\{1, 2, 3\}$

$\{1, 3, 2\}$

$\{3, 1, 3, 2\}$

ovat joukkoina samat:

$$\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\} = \{3, 1, 3, 2\}$$

- *Jonot*

123

132

ovat eri jonoja:

$$(1, 2, 3) \neq (1, 3, 2)$$

Joukon osajoukot:

Esimerkki

- Olkoon

$$S = \{1, 2, 3\}$$

- Kaikki joukon S alkioiden muodostamat *osajoukot*:

Kolmen alkion osajoukot:

$$\{1, 2, 3\} \qquad 1 \text{ kpl}$$

Kahden alkion osajoukot:

$$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\} \qquad 3 \text{ kpl}$$

Yhden alkion osajoukot:

$$\{1\}, \{2\}, \{3\} \qquad 3 \text{ kpl}$$

- *Kaikki* joukon S :n osajoukot:

$$\{1, 2, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \emptyset \qquad 8 \text{ kpl}$$

Joukon osajonot:

Esimerkki

- Olkoon

$$S = \{1, 2, 3\}$$

- Kaikki joukon S alkioiden muodostamat *osajonot*:

Kolmen alkion osajonot:

123, 132, 213, 231, 312, 321 6 kpl

Kahden alkion osajonot:

12, 21, 13, 31, 23, 32 6 kpl

Yhden alkion osajonot:

1, 2, 3 3 kpl

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka

Klassinen todennäköisyys

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

>> Permutaatiot ja variaatiot

Kombinaatiot ja binomikertoimet

Multinomikertoimet

Permutaatiot ja variaatiot

Avainsanat

Jono

Joukko

Kertoma

Kombinatoriikan perusongelmat

k -permutaatio

n -kertoma

Osajono

Permutaatio

Permutaatioiden lukumäärä

Symmetriset alkeistapahtumat

Variaatio

Variaatioiden lukumäärä

Permutaatio

- Olkoon äärellisen joukon S (erilaisten) alkioiden lukumäärä $n = n(S)$.
- Mikä tahansa joukon S kaikkien alkioiden muodostama *jono* on joukon S alkioiden **permutaatio**.

Permutaatioiden lukumäärä

- Olkoon äärellisen joukon S (erilaisten) alkioden lukumäärä $n = n(S)$.
- Tällöin joukon S alkioden kaikkien mahdollisten *permutaatioiden lukumäärä* on

$$n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$$


jossa $n!$ on ns. *n-kertoma*.

- Tulos ratkaisee *kombinatoriikan perusongelman* (1a):
Kuinka monella erilaisella tavalla joukon S alkiot voidaan järjestää *jonoon*?

Permutaatioiden lukumäärä:

Perustelu 1/4

- Käytetään permutaatioiden lukumäärän kaavan johdossa apuna ns. **lokeromallia**.
- Olkoon joukon S alkioiden lukumäärä n .
- Oletetaan, että käytettävissä on *lokerikko*, jossa on n *lokeroa*.
- Asetetaan joukon S alkiot lokeriin yksi kerrallaan niin, että jokaiseen lokeroon tulee täsmälleen yksi alkio.




Permutaatioiden lukumäärä:

Perustelu 2/4

- Lokeroiden täyttäminen voidaan tehdä *vaiheittain*.
- Vaiheessa $k = 1, 2, \dots, n$:
 - (i) Lokeroista on täytetty $(k - 1)$ kpl.
 - (ii) Joukossa S on jäljellä $(n - k + 1)$ alkioita.
 - (iii) Suoritetaan operaatio

“Valitaan joukon S jäljellä olevista alkioista yksi lokeroon k ”





Permutaatioiden lukumäärä: Perustelu 4/4

- Tarkastellaan *yhdistettyä* operaatiota, jossa kaikki vaiheet $k = 1, 2, \dots, n$ käydään läpi peräkkäin.
- Kysymys:
Kuinka monella eri tavalla tämä *yhdistetty operaatio* voidaan suorittaa?
- Koska jokainen valintaoperaatio voidaan suorittaa *edellisistä vaiheista riippumatta*, kombinatoriikan *kertolaskuperiaatteesta* seuraa, että lokeroiden täyttäminen voidaan tehdä

$$n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1 = n!$$

eri tavalla.



Permutaatiot ja variaatiot

***n*-kertoma**

- ***n*-kertoma** voidaan laskea seuraavalla *palautuskaavalla*:

$$n! = n \times (n - 1)! , n = 1, 2, \dots$$

- Määritellään:

$$0! = 1$$

- Palautuskaavasta:

$$1! = 1 \times 0! = 1 \times 1 = 1$$

$$2! = 2 \times 1! = 2 \times 1 = 2$$

$$3! = 3 \times 2! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$4! = 4 \times 3! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$5! = 5 \times 4! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

...

Variaatio eli k -permutaatio

- Olkoon äärellisen joukon S (erilaisten) alkioiden lukumäärä $n = n(S)$.
- Mikä tahansa joukon S alkioiden *osajono*, jossa on k alkiota, on joukon S alkioiden **variaatio** eli **k -permutaatio**.
- Merkintä:
$$P(n, k) = n:n \text{ alkion joukon } k\text{-permutaatioiden lukumäärä}$$
- Jos $k = n$, saadaan joukon S alkioiden *permutaatio*.

Variaatioiden eli k -permutaatioiden lukumäärä

- Olkoon äärellisen joukon S (erilaisten) alkioiden lukumäärä $n = n(S)$.
- Tällöin joukon S alkioiden kaikkien mahdollisten k -permutaatioiden lukumäärä on

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- Tulos ratkaisee *kombinatoriikan perusongelman* (1b):
Kuinka monella erilaisella tavalla joukon S alkioista voidaan muodostaa k :n alkion osajono?

Variaatioiden eli k -permutaatioiden lukumäärä:

Huomautus

- Jos

$$k = n$$

kutistuu kombinatoriikan perusongelma (1b)
perusongelmaksi (1a), jolloin

$$P(n, n) = n!$$

Variaatioiden eli k -permutaatioiden lukumäärä: Perustelu

- Olkoon joukon S alkioiden lukumäärä n .
- Joukon S kaikkien alkioiden permutaatioiden lukumäärää koskevasta todistuksesta nähdään, että n :stä alkiosta voidaan valita k alkiota k :hon *ensimmäiseen* lokeroon

$$n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - k + 1)$$

eri tavalla.

- Laventamalla saadaan

$$\begin{aligned} & n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - k + 1) \\ &= \frac{n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - k + 1) \times (n - k)!}{(n - k)!} \\ &= \frac{n!}{(n - k)!} \end{aligned}$$

Permutaatioiden lukumäärä:

Esimerkki 1/4

- Kuinka monta erilaista *3-numeroista kokonaislukua* voidaan muodostaa numeroista

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?

kun lukuja muodostettaessa merkitään ”etunollat” näkyviin.

Esimerkkejä: $5 = 005$ ja $19 = 019$

- Kaikki näin saatavat 3-numeroiset kokonaisluvut ovat muotoa

xyz

olevia *jonoja*, joissa numerot x , y ja z valitaan joukosta

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

- Numeroiden x , y ja z valinta jonoon xyz voidaan tehdä *kahdella* eri tavalla:

(i) Aikaisemmin valitun numeron *saa* valita uudelleen.

(ii) Aikaisemmin valittua numeroa *ei saa* valita uudelleen.

Permutaatioiden lukumäärä:

Esimerkki 2/4

- Tarkastellaan ensin tapausta
 - (i) Aikaisemmin valitun numeron *saa* valita uudelleen.
- Käytetään apuna *lokeromallia*.
- Kokonaisluku xyz muodostuu kolmesta lokerosta, joista jokainen voidaan täyttää *toisistaan riippumatta* 10:llä erilaisella objektilla.
- *Kertolaskuperiaatteen* mukaan lokerot xyz voidaan täyttää
$$10 \times 10 \times 10 = 1000$$
eri tavalla.
- Siten erilaisia 3-numeroisia lukuja, *joissa saa olla samoja numeroita*, on 1000 kpl.
- Tulos on tietysti sopusoinnussa sen kanssa, että kokonaislukujen
$$000, 001, 002, \dots, 010, 011, 012, \dots, 100, 101, 102, \dots, 999$$
lukumäärä on 1000.

Permutaatioiden lukumäärä:

Esimerkki 3/4

- Tarkastellaan seuraavaksi tapausta
 - (ii) Aikaisemmin valittua numeroa *ei saa* valita uudelleen.
- Käytetään apuna *lokeromallia*.
- Kokonaisluku xyz muodostuu kolmesta lokerosta, jotka voidaan täyttää vaiheittain seuraavalla tavalla:
 - (1) 1. lokero x voidaan täyttää 10 erilaisella objektilla.
 - (2) 2. lokero y voidaan täyttää *vaiheesta* (1) *riippumatta* 9 erilaisella objektilla, koska 1 objektista on käytetty.
 - (3) 3. lokero z voidaan täyttää *vaiheesta* (2) *riippumatta* 8 erilaisella objektilla, koska 2 objektista on käytetty.
- *Kertolaskuperiaatteen* mukaan lokerot xyz voidaan täyttää
$$10 \times 9 \times 8 = 720$$
eri tavalla.

Permutaatioiden lukumäärä:

Esimerkki 4/4

- Siten erilaisia 3-numeroisia lukuja, *joissa sama numero ei saa esiintyä kuin kerran*, on 720 kpl.
- Huomaa, että sama tulos saadaan huomaamalla, että tapauksessa (ii) on määrättävä joukon $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 3-permutaatioiden lukumäärä.
- 3-permutaatioiden lukumääräksi saadaan

$$P(10, 3) = \frac{10!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

mikä tietysti yhtyy edellä saatuun tulokseen.

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka

Klassinen todennäköisyys

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Permutaatiot ja variaatiot

>> Kombinaatiot ja binomikertoimet

Multinomikertoimet

Kombinaatiot ja binomikertoimet

Avainsanat

Binomi

Binomikaava

Binomikerroin

Jono

Joukko

Kombinaatio

Kombinaatioiden lukumäärä

Kombinatoriikan perusongelmat

n -kertoma

Osajoukko

Osajoukkojen lukumäärä

Pascalin kolmio

Permutaatio

Kombinaatio

- Olkoon äärellisen joukon S alkioden lukumäärä $n = n(S)$.
- Mikä tahansa joukon S osajoukko, jossa on k alkioda, muodostaa joukon S alkioden k alkioda sisältävän **kombinaation**.
- Merkintä:

$C(n, k) = n:n$ alkion joukon k alkioda sisältävien kombinaatioiden lukumäärä

Kombinaatioiden lukumäärä

- Olkoon joukon S alkioden lukumäärä $n = n(S)$.
- Tällöin joukon S alkioden kaikkien mahdollisten k alkioita sisältävien kombinaatioiden lukumäärä on

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

jossa

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$$

on ns. n -kertoma.

- Tulos ratkaisee *kombinatoriikan perusongelman (2)*:
Kuinka monella erilaisella tavalla joukon S alkioista voidaan muodostaa k :n alkion osajoukko?

Kombinaatioiden lukumäärä ja binomikertoimet

- Kombinaatioiden lukumäärää $C(n, k)$ merkitään usein ns. **binomikertoimella**

$$\binom{n}{k}$$

joka luetaan “ n yli k :n”.

- Binomikertoimen määrittely ja nimityksen tausta: ks. >.

Kombinaatioiden lukumäärä:

Perustelu 1/3

- Oletetaan, että joukossa S on $n(S) = n$ alkiota.
- Kombinaatioiden lukumäärää koskeva kaava voidaan perustella *määräämällä* joukon S alkioiden k alkiota sisältävien *permutaatioiden lukumäärä kahdella eri tavalla* ja merkitsemällä tulokset yhtä suuriksi.
- Joukon S , jossa on n alkiota, k -permutaatioiden lukumäärä on aikaisemman tuloksen perusteella

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Kombinaatioiden lukumäärä:

Perustelu 2/3

- Toisaalta joukon S alkioiden permutointi voidaan tehdä *kahdessa vaiheessa*:
 - (1) Valitaan joukon S alkioista k alkiota sisältävä osajoukko.
Tämä voidaan tehdä $C(n, k)$ eri tavalla, jossa $C(n, k)$ on siis toistaiseksi tuntematon luku.
 - (2) Järjestetään valitun osajoukon k alkiota jonoon.
Tämä voidaan tehdä $k!$ eri tavalla.
- Vaiheet (1) ja (2) voidaan suorittaa *toisistaan riippumatta*.

Kombinaatioiden lukumäärä:

Perustelu 3/3

- Kombinatoriikan *kertolaskuperiaatteen* mukaan joukon S alkioiden k alkiota sisältävien *permutaatioiden lukumäärä* on siis

$$P(n, k) = C(n, k)k!$$

- Sijoittamalla tähän permutaatioiden lukumäärän lauseke

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

saadaan yhtälö

$$C(n, k)k! = \frac{n!}{(n-k)!}$$

josta $C(n, k)$ ratkaisemalla saadaan haluttu tulos.

Kombinaatioiden lukumäärä:

Esimerkki 1/3

- Edellä on käsitelty esimerkkiä, jossa tarkasteltiin 3-numeroisten lukujen muodostamista, kun käytössä on numerot
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Tällöin todettiin seuraavaa:
 - (i) Jos sama numero *saa* esiintyä luvussa useamman kerran, erilaisia lukuja on 1000 kpl.
 - (ii) Jos sama numero *ei saa* esiintyä luvussa useammin kuin kerran, erilaisia lukuja on 720 kpl.
 - Kummassakin tapauksessa 3-numeroisia lukuja käsiteltiin numeroiden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muodostamina *jonoina*.
 - Määrätään nyt kuinka monella eri tavalla numeroiden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muodostamasta joukosta
 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
voidaan valita *osajoukko*, jossa on 3 alkiota.
-

Kombinaatioiden lukumäärä:

Esimerkki 2/3

- Ratkaisun antaa binomikerroin $C(10, 3)$:

$$C(10,3) = \binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2} = 120$$

- Siten joukosta

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

voidaan valita 3:n alkion *osajoukko* 120:llä eri tavalla.

Kombinaatioiden lukumäärä:

Esimerkki 3/3

- Huomaa asetettujen ehtojen vaikutus:
 - (i) Numeroista 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voidaan muodostaa 1000 kpl 3-numeroisia lukuja, *joissa sama numero saa esiintyä useamman kerran.*
 - (ii) Joukosta $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ voidaan muodostaa 720 kpl 3:n numeron *osajonoja.*
 - (iii) Joukosta $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ voidaan muodostaa 120 kpl 3:n numeron *osajoukkoja.*

Permutaatiot vs kombinaatiot

- Joukon alkioiden *permutaatioissa* alkioiden *järjestyksellä on merkitystä*.
- Joukon alkioiden *kombinaatioissa* alkioiden *järjestyksellä ei ole merkitystä*.

Permutaatiot vs kombinaatiot: Esimerkkejä

- Opiskelijaravintolan ruokajono muodostaa siinä seisovien opiskelijoiden *permutaation*, jossa opiskelijoiden järjestyksellä on merkitystä jonottaville opiskelijoille.
- Lotossa oikean rivin antavat 7 voitonnumeroa muodostavat 39:n numeron joukon erään 7:n alkion *kombinaation*, jossa numeroiden arvontajärjestyksellä ei ole merkitystä.

Kombinaatiot ja binomikertoimet

Binomikerroin

- Kerrointa

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C(n, k)$$

kutsutaan **binomikertoimeksi**.


- Binomikerroin luetaan “ n yli $k:n$ ”.
- Koska $0! = 1$, niin

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1 = \frac{n!}{n!0!} = \binom{n}{n}$$

Kombinaatit ja binomikertoimet

Pascalin kolmio

- *Binomikertoimet* voidaan muodostaa käyttäen apuna ns. **Pascalin kolmiota** (5 ensimmäistä riviä):



- Lukuun ottamatta kolmion reunoilla olevia ykkösiä, Pascalin kolmion luvut saadaan laskemalla yhteen kaksi edeltävän rivin lukua nuolten suuntaan.

Pascalin kolmion muodostamissääntö

- Binomikertoimet

$$C(n, 0), C(n, 1), C(n, 2), \dots, C(n, n - 1), C(n, n)$$

muodostavat Pascalin kolmion $(n + 1)$. rivin luvut.

- Siten Pascalin kolmion *muodostamissääntö* voidaan ilmaista binomikertoimien avulla seuraavasti:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

- Sanoin:

Pascalin kolmion n . rivin k . luku saadaan laskemalla yhteen $(n - 1)$. rivin $(k - 1)$. luku ja k . luku.

Pascalin kolmion muodostamissääntö: Perustelu

- Pascalin kolmion *muodostamissääntö* voidaan perustella seuraavalla tavalla:

$$\begin{aligned}\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} + \frac{(n-1)!}{k!((n-1)-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\ &= \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(k+(n-k))(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}\end{aligned}$$

Pascalin kolmion symmetrisyys

- Pascalin kolmio on *symmetrinen* kolmion rivien keskikohdan suhteen:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

Pascalin kolmion symmetrisyys: Perustelu

- Pascalin kolmion *symmetrisyys* kolmion rivien keskikohdan suhteen voidaan perustella seuraavalla tavalla:

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} \\ &= \binom{n}{n-k}\end{aligned}$$

Binomikaava

- **Binomikaavan** mukaan n :s potenssi binomille $x + y$ voidaan esittää muodossa

$$\begin{aligned}(x + y)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \\ &= \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \dots \\ &\quad + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n\end{aligned}$$

Binomikaava:

Perustelu 1/3

- Kun binomi $x + y$ korotetaan potenssiin n , saadaan summalauseke, jonka kaikki termit ovat muotoa

$$x^{n-k} y^k, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

- *Yhdistetään* sellaiset termit, joissa esiintyy *sama* x :n potenssi ja *järjestetään* näin saadut termit x :n alenevien potenssien mukaiseen järjestykseen.

- Yhdistämisen tuloksena saadaan $(n + 1)$ termiä sisältävä summalauseke, jonka $(k + 1)$. termi on muotoa

$$D(n, k) x^k y^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

jossa $D(n, k)$ on muotoa $x^k y^{n-k}$ olevien termien lukumäärä.

- Tehtävänä on määrätä $D(n, k)$ eli se *kuinka monella eri tavalla muotoa* $x^k y^{n-k}$ *oleva termi syntyy* korotettaessa binomi $x + y$ potenssiin n .

Binomikaava:

Perustelu 2/3

- Käytetään tehtävän ratkaisemisessa *lokeromallia*.
- Täytetään lokerikko, jossa on n lokeroa, tyyppiä x ja tyyppiä y olevilla objekteilla, kun tyyppiä x olevia objekteja on $(n - k)$ kpl ja tyyppiä y olevia objekteja on k kpl.
- Kuinka monella eri tavalla tämä täyttöoperaatio voidaan suorittaa?
- Huomaa, että tyyppiä y olevien objektien paikat *on määrätty* sen jälkeen, kun tyyppiä x olevat objektit on saatu sijoitetuksi.
- Siksi riittää tarkastella sitä, kuinka monella eri tavalla $(n - k)$ kpl tyyppiä x olevaa objektia voidaan sijoittaa lokeriin, jossa on n lokeroa.

Binomikaava:

Perustelu 3/3

- Tämä tehtävä voidaan formuloida myös seuraavassa, vaihtoehtoisessa muodossa:

Kuinka monella eri tavalla joukosta, jossa on n alkiota, voidaan valita *osajoukko*, jossa on $(n - k)$ alkiota?

- Tämä on *kombinatoriikan perusongelma (2)*.
- Siten kysytyn lukumäärän $D(n, k)$ antaa *binomikerroin*

$$C(n, k) = \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

Binomikaava:

Esimerkki 1/2

- *Binomikaavan* mukaan 4. potenssi binomille $x + y$ voidaan esittää muodossa

$$\begin{aligned}(x + y)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} x^{4-k} y^k \\ &= \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3 y + \binom{4}{2} x^2 y^2 + \binom{4}{3} xy^3 + \binom{4}{4} y^4 \\ &= x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4xy^3 + y^4\end{aligned}$$

- Tulos on sopusoinnussa sen kanssa, että *Pascalin kolmion* 5. rivin luvut ovat

1, 4, 6, 4, 1

Binomikaava:

Esimerkki 2/2

- Tarkastellaan esimerkkinä, miten tyyppiä x^2y^2 olevat termit syntyvät.
- Kaikki mahdolliset muotoa x^2y^2 olevat tulot ovat

$$xxyy \quad xyxy \quad xyyx$$

$$yxxxy \quad yxyx \quad yyxx$$

- Tuloja on siis 6 kappaletta.
- Koska tässä $n = 4$ ja $k = 2$, binomikertoimen kaavasta saadaan tämän tuloksen kanssa yhtäpitävästi

$$C(4, 2) = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 2 \times 1} = 6$$

Kombinaatiot ja binomikertoimet

Osajoukkojen lukumäärä

- Olkoon joukon S alkioden lukumäärä $n = n(S)$.
- Joukon S osajoukkojen lukumäärä on

$$2^n$$

- Lukumäärässä ovat mukana:
 - (1) Tyhjä joukko \emptyset
 - (2) Kaikki *yhden* alkion osajoukot
 - (3) Kaikki *kahden* alkion osajoukot
 - (4) Kaikki *kolmen* alkion osajoukot
 - ...
 - (n) Kaikki ($n - 1$):n alkion osajoukot
 - ($n + 1$) Joukko S

Osajoukkojen lukumäärä: Perustelu 1/2

- Olkoon joukon S alkioden lukumäärä $n = n(S)$.
- Joukolla S on k alkia sisältävien kombinaatioiden lukumäärää koskevan tuloksen mukaan

$$C(n, k) = \binom{n}{k}$$

osajoukkoa, jossa on k alkia, $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

- Joukon S osajoukkojen kokonaislukumäärä N saadaan laskemalla kaikki binomikertoimet $C(n, k)$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$ yhteen:

$$N = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$$

- Toisaalta *binomikaavasta* saadaan sijoittamalla $x = y = 1$:

$$(1+1)^n = 2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$$

Osajoukkojen lukumäärä:

Perustelu 2/2

- Yhdistämällä nämä tulokset saadaan joukon S , jossa on $n = n(S)$ alkia, kaikkien osajoukkojen lukumääräksi

$$N = 2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$$

jossa binomikerroin

$$\binom{n}{k}$$

kertoo joukon S sellaisten osajoukkojen lukumäärän, joissa on k alkia, $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

Kombinatorisia laskutoimituksia:

Esimerkki 1

- Lotossa 1 ruudukko lototaan valitsemalla 7 numeroa 39:stä.
- Montako erilaista lottoruudukkoa on olemassa?
- Toinen muotoilu:
Kuinka monta erilaista 7 alkion osajoukkoa voidaan valita 39 erilaisen alkion joukosta?
- Vastauksen antaa *kombinaatioiden lukumäärää* koskeva tulos:

$$\binom{39}{7} = \frac{39!}{7!32!} = 15\,380\,937$$

Kombinatorisia laskutoimituksia:

Esimerkki 2

- Montako sellaista lottoruudukkoa on olemassa, joissa on *täsmälleen* 5 oikein?
- 5 oikein saadaan, jos on valittu 5 oikeata numeroa 7 oikean numeron joukosta ja 2 väärää numeroa 32 väärän numeron joukosta.
- Valinnat voidaan tehdä *toisistaan riippumatta*.
- *Kertolaskuperiaatteen* mukaan 5 oikein sisältävien rivien lukumäärä on

$$\binom{7}{5} \binom{32}{2} = \frac{7!}{5!2!} \times \frac{32!}{2!30!} = 21 \times 496 = 10\,416$$

Kombinatorisia laskutoimituksia:

Esimerkki 3

Korttipelit: *pokeri*

- Montako erilaista 5 kortin kättä on olemassa?
- Kombinaatioiden lukumäärää koskevan tuloksen mukaan:

$$\binom{52}{5} = 2\,598\,960$$

Korttipelit: *bridge*

- Montako erilaista 13 kortin kättä on olemassa?
- Kombinaatioiden lukumäärää koskevan tuloksen mukaan:

$$\binom{52}{13} = 635\,013\,559\,600$$

Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka

Klassinen todennäköisyys

Kombinatoriikan perusperiaatteet ja perusongelmat

Permutaatiot ja variaatiot

Kombinaatiot ja binomikertoimet

>> Multinomikertoimet

Multinomikerroimet

Avainsanat

Binomikerroin

Multinomi

Multinomikerroin

Ositus

Multinomikerroin 1/2

- Olkoon äärellisen joukon S alkioden lukumäärä $n = n(S)$.
- Oletetaan, että positiiviset kokonaisluvut

$$n_i, i = 1, 2, \dots, k$$

toteuttavat ehdon

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

- *Ositetaan* joukko S *pistevieraisiin* osajoukkoihin

$$A_i, i = 1, 2, \dots, k$$

siten, että joukossa A_i on $n(A_i) = n_i$ alkiota.

- *Kuinka monella tavalla* joukko S voidaan osittaa pistevieraisiin osajoukkoihin niin, että osajoukkojen alkioden lukumäärät toteuttavat ym. ehdot?

Multinomikerroin 2/2

- Joukko S , jossa on $n = n(S)$ alkioita, voidaan *osittaa*

$$\binom{n}{n_1 \quad n_2 \quad \cdots \quad n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

tavalla *pistevieraisiin osajoukkoihin* A_i , $i = 1, 2, \dots, k$, joiden alkioden lukumäärät toteuttavat ehdot:

- (i) $n(A_i) = n_i$, $i = 1, 2, \dots, k$,
 - (ii) $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.
- Lukumäärän antavaa lauseketta kutsutaan **multinomi-kertoimeksi**.

Multinomikerroin: Kommentteja

- Epätyhjät joukot $A_i \subset S$, $i = 1, 2, \dots, k$ muodostavat joukon S **osituksen**, jos

$$S = \bigcup_{i=1}^k A_i \quad \text{ja} \quad A_i \cap A_j = \emptyset, \text{ kun } i \neq j$$

- *Multinomikerroin* kertoo *kuinka monella eri tavalla* joukko S , jossa on n alkiota, voidaan *ositaa* pistevieraisiin osajoukkoihin A_i , $i = 1, 2, \dots, k$ niin, että osajoukossa A_i on n_i alkiota ja

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k .$$

Multinomikerroin: Kommentteja

- Multinomikertoimet ovat kertoimina *multinomin*

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n$$

kehityskaavassa tuloissa

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k}$$

joissa siis

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$$

- *Binomikerroin* saadaan multinomikertoimen erikoistapauksena, kun $k = 2$.

Multinomikertoimet

Multinomikerroin:

1. esimerkki 1/2

- Sanassa *kasa* on 4 kirjainta, joiden joukossa on 3 *erilaista* kirjainta:

k 1 kpl

a 2 kpl

s 1 kpl

- Kuinka monta *erilaista* neljän kirjaimen mittaista ”sanaa” voidaan muodostaa permutoimalla kirjaimia *k*, *a*, *a* ja *s*?
- Erilaisten sanojen lukumäärän antaa *multinomikerroin*

$$\binom{4}{1 \ 2 \ 1} = \frac{4!}{1!2!1!} = 12$$

Multinomikerroin:

1. esimerkki 2/2

- *Tässä tapauksessa erilaiset sanat on helppo luetella:*

a-alkuiset sanat:

aaks aask akas aksa asak aska

k-alkuiset sanat:

kaas kasa ksa

s-alkuiset sanat

saak saka skaa

- Sanoja on todellakin 12 kpl kuten edellä todettiin.

Multinomikerroin:

2. esimerkki

Korttipeli: *pokeri*

- Oletetaan, että peliin osallistuu 4 pelaajaa.
- Jaetaan 5 korttia jokaiselle pelaajalle.
- Kuinka monta erilaista jakoa on olemassa?
- Korttipakka (52 kortin pakka) jaetaan siis 5 osaan, joissa on 5, 5, 5, 5 ja 32 korttia.
- Erilaisten jakojen lukumäärän antaa *multinomikerroin*

$$\binom{52}{5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 32} = \frac{52!}{5!5!5!5!32!} = 1.47 \times 10^{24}$$