
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Verkot ja todennäköisyyslaskenta

Verkot ja todennäköisyyslaskenta

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit

Toimintaverkot

Verkot ja todennäköisyyslaskenta: Mitä opimme?

- **Verkkoteoria** on hyödyllinen sovelletun matematiikan osa-alue, jolla on sovelluksia esimerkiksi *logiikassa, operaatiotutkimuksessa, peli- ja päätösteoriassa* sekä **todennäköisyyslaskennassa**.
- Tässä luvussa tarkastelemme ensin miten **puumaisia verkkoja** voidaan käyttää apuna **todennäköisyyslaskennan tehtävien** ratkaisemisessa.
- Samalla esitämme sovellusesimerkkejä ns. **päätöspuiden** käytöstä päätösongelmien ratkaisemisessa.
- Toisena verkkoteorian sovelluksena tarkastelemme ns. **toimintaverkkojen** toimintatodennäköisyyksien määräämistä.

Verkot ja todennäköisyyslaskenta: Esitiedot

- Esitiedot: ks. seuraavia lukuja:
 - Todennäköisyys ja sen määrittelemisen**
 - Todennäköisyyden peruslaskusäännöt**

Verkot ja todennäköisyyslaskenta: Lisätiedot

- **Verkkoteorian peruskäsitteet** esitetään liitteessä
Verkot
- **Todennäköisyyslaskennan peruslaskusääntöjen** havainnollistamista
puumaisten verkkojen avulla käsitellään liitteessä
Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit

Verkot ja todennäköisyyslaskenta

- >> Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto**
- Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit**
- Toimintaverkot**

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

Avainsanat

Puudiagrammi

Reitti

Särmä

Tulosääntö

puutodennäköisyyksille

Verkko

Verkkodiagrammi

Yhteenlaskusääntö

puutodennäköisyyksille

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto


Lastenhankkimisstrategian onnistumistodennäköisyys 1/6

- Tehdään lasten syntymisestä seuraavat (yksinkertaistavat) oletukset:
 - (i) Lapset syntyvät aina yksi kerrallaan.
 - (ii) Syntyvän lapsen sukupuoli *ei riipu* aikaisemmin syntyneiden lasten sukupuolesta.
 - (iii) $\Pr(\text{Poika}) = \Pr(\text{Tyttö}) = 1/2$.
- Eräs pariskunta haluaa saada *tytön*, mutta *ei halua* hankkia *neljää lasta enempää*.
- Pariskunta päättää käyttää lasten hankkimisessa seuraavaa *strategiaa*:
 - (i) Lapsia hankitaan *kunnes* saadaan tyttö.
 - (ii) Lapsia ei kuitenkaan hankita *neljää enempää*.
- Jos siis neljäskin lapsi on poika, pariskunta on *epäonnistunut* strategiassaan.
- Mikä on todennäköisyys, että pariskunta *onnistuu* strategiassaan?

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

Lastenhankkimisstrategian onnistumistodennäköisyys 2/6

- Pariskuntaa kohtaavia *tapahtumavaihtoehtoja* vastaava puudiagrammi on esitetty oikealla.
- Puudiagrammissa:
 $T =$ Tyttö ja $P =$ Poika
- Diagrammin vasemmanpuoleiset *särmät* johtavat strategian onnistumiseen.
- Diagrammin oikeanpuoleiset *särmät* johtavat strategian epäonnistumiseen.
- Jokaisen särmän *todennäköisyys* $= 1/2$.



Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

Lastenhankkimisstrategian onnistumistodennäköisyys 3/6

- Olkoon

A = Pariskunta onnistuu strategiassaan

T_i = i . lapsi on tyttö

P_i = i . lapsi on poika

T = Syntyy tyttö

P = Syntyy poika

- Tapahtumat T_1, T_2, T_3, T_4 muodostavat joukon A osituksen:

$$A = T_1 \cup T_2 \cup T_3 \cup T_4, \quad T_i \cap T_j = \emptyset, \quad i \neq j$$

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

Lastenhankkimisstrategian onnistumistodennäköisyys 4/6

- Tapahtumien T_i ja P_i todennäköisyydet $\Pr(T_i)$ ja $\Pr(P_i)$, $i = 1, 2, 3, 4$ voidaan määrätä *rekursiivisesti*.
- Riippumattomien tapahtumien *tulosäännön* nojalla:

$$\Pr(T_1) = \Pr(T) = \frac{1}{2} = \Pr(P_1)$$

$$\Pr(T_2) = \Pr(T \cap P_1) = \Pr(T) \Pr(P_1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \Pr(P_2)$$

$$\Pr(T_3) = \Pr(T \cap P_2) = \Pr(T) \Pr(P_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = \Pr(P_3)$$

$$\Pr(T_4) = \Pr(T \cap P_3) = \Pr(T) \Pr(P_3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = \Pr(P_4)$$

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

Lastenhankkimisstrategian onnistumistodennäköisyys 5/6


- Strategian *onnistumisen todennäköisyydeksi* saadaan toisensa poissulkevien tapahtumien *yhteenlaskusäännön* nojalla:

$$\begin{aligned}\Pr(A) &= \Pr(T_1 \cup T_2 \cup T_3 \cup T_4) \\ &= \Pr(T_1) + \Pr(T_2) + \Pr(T_3) + \Pr(T_4) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \\ &= \frac{15}{16}\end{aligned}$$

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

Lastenhankkimisstrategian onnistumistodennäköisyys 6/6

- Todennäköisyydet $1/2, 1/4, 1/8, 1/16$ saadaan määräämällä *loppupisteisiin T vievien reittien todennäköisyydet*.
- Reittien todennäköisyydet saadaan *reitien muodostavien särmien todennäköisyyksien tulona*.
- Strategian onnistumisen todennäköisyys $15/16$ saadaan laskemalla *loppupisteisiin T vievien reittien todennäköisyydet yhteen*.



Verkot ja todennäköisyyslaskenta

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

>> Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit
Toimintaverkot

Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit

Avainsanat

Alkutila
Juuri
Loppupiste
Lopputila
Piste
Puu
Puudiagrammi
Puutodennäköisyys
Reitti

Särmä
Tapahtumajono
Tapahtumavaihtoehto
Tulosääntö
 puutodennäköisyyksille
Verkko
Verkkodiagrammi
Yhteenlaskusääntö
 puutodennäköisyyksille

Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit

Puudiagrammien käyttö todennäköisyyslaskennassa

- Periaatteessa jokainen *alkeistodennäköisyyslaskennan* tehtävä voidaan ratkaista käyttämällä apuna ns. **puudiagrammeja**.
- Jos tehtävän satunnaisilmiötä osataan kuvata puudiagrammilla, tehtävän ratkaisemisessa tarvittavat **puutodennäköisyydet** saadaan määräytyksi käyttämällä kahta yksinkertaista laskusääntöä, **tulosääntöä** ja **yhteenlaskusääntöä**.

Puudiagrammin konstruointi 1/2

- Satunnaisilmiötä voidaan kuvata **puudiagrammilla**, jos ilmiö osataan esittää seuraavassa muodossa:
 - (i) Ilmiöllä on yksi **alkutila** ja yksi tai useampia **lopputiloja**.
 - (ii) Ilmiö koostuu *vaihtoehtoisista tapahtumajonoista*.
 - (iii) Tapahtumajonoissa edetään **vaiheittain** *tapahtumasta toiseen* lähtien ilmiön alkutilasta ja päätyen johonkin ilmiön lopputiloista.
 - (iv) Jokaisessa **vaiheessa** kohdataan yksi tai useampia **tapahtumavaihtoehtoja**, joista yksi *realisoituu* ja johtaa *uusin* tapahtumavaihtoehtoihin.

Puudiagrammin konstruointi 2/2


- Satunnaisilmiötä vastaavan **puudiagrammin konstruointi**:
 - (i) Asetetaan puun **juuri** vastaamaan ilmiön *alkutilaa*.
 - (ii) Asetetaan puun **loppupisteet** ("oksien kärjet") vastaamaan ilmiön *lopputiloja*.
 - (iii) Asetetaan puun **pisteet** ("oksien haarautumiskohdat") vastaamaan ilmiön *tapahtumia*.
 - (iv) Viedään puun jokaisesta pisteestä **särmä** ("oksa") kaikkiin sellaisiin pisteisiin, joita vastaavat *tapahtumavaihtoehdot* ovat ilmiön *siinä vaiheessa mahdollisia*.
 - (v) Liitetään jokaiseen pisteestä *lähtevään* särmään *siinä vaiheessa* mahdollisten **tapahtumavaihtoehtojen todennäköisyydet**.
-

Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit

Puudiagrammin konstruointi:

Esimerkki 1/3

- Puudiagrammin konstruointia voidaan havainnollistaa viereisellä kaaviolla.
- Tarkastellaan satunnaisilmiötä *vaiheessa*, jossa tapahtuma A on sattunut.
- Olkoot A :n sattumisen jälkeen *mahdolliset tapahtumavaihtoehdot* B_i , $i = 1, 2, \dots, m$




Todennäköyslaskenta ja puudiagrammit

Puudiagrammin konstruointi:

Esimerkki 2/3

- Viedään pisteestä A *särmä* jokaiseen pisteistä B_i , $i = 1, 2, \dots, m$
- Liitetään jokaiseen särmään (A, B_i) , $i = 1, 2, \dots, m$ *ehdollinen todennäköisyys* $p_i = \Pr(B_i | \vec{A})$ jossa \vec{A} on tapahtumajono, joka on tuonut pisteeseen A .




Todennäköisyysslaskenta ja puudiagrammit

Puudiagrammin konstruointi:

Esimerkki 3/3

- Koska A :n sattumisen jälkeen *ei ole muita mahdollisia tapahtumavaihtoehtoja* kuin B_i , $i = 1, 2, \dots, m$, niin todennäköisyyksien p_i , $i = 1, 2, \dots, m$ pitää toteuttaa ehto

$$\sum_{i=1}^m p_i = \sum_{i=1}^m \Pr(B_i | \vec{A}) = 1$$



Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit

Puudiagrammin konstruointi: Kommentteja

- Puudiagrammi *piirretään* tavallisesti *joko* niin, että sen alkupiste on ylhäällä ja loppupisteet ovat alhaalla *tai* niin, että sen alkupiste on vasemmalla ja loppupisteet ovat oikealla.
- Useat puun pisteet voivat vastata *samaa* tapahtumaa.
- Mistä tahansa puun pisteestä *lähtevien särmien* todennäköisyyksien summa on 1.

- **Puutodennäköisyydellä** tarkoitetaan todennäköisyyttä päästä *puun alkupisteestä yhden tai useamman muun puun pisteen määräämään yhdistettyyn tapahtumaan*.
- *Pisteen todennäköisyys* saadaan määräämällä alkupisteestä ko. pisteeseen vievän *reitin todennäköisyys*.
- *Reitin todennäköisyys* saadaan soveltamalla reittiin kuuluvien särmien todennäköisyyksiin **tulosääntöä**.
- *Usean pisteen määräämän yhdistetyn tapahtuman todennäköisyys* saadaan soveltamalla ko. pisteisiin vievien reittien todennäköisyyksiin **yhteenlaskusääntöä**.

Puutodennäköisyydet:

Tulosääntö 1/4

- *Reitin todennäköisyys* saadaan määrämällä reittiin kuuluvien särmien todennäköisyyksien *tulo*.
- Sääntöä kutsutaan **puutodennäköisyyksien tulosäännöksi**.
- Tulosäännön perustelu:
 - (1) Reitti on *tapahtumajono*, jonka muodostavat reitin pisteet.
 - (2) Reitin muodostava tapahtumajono sattuu, jos *jokainen jonon tapahtumista sattuu*.
 - (3) Todennäköisyyslaskennan *yleisen tulosäännön mukaan* reitin todennäköisyys saadaan määrämällä reittiin kuuluvien särmien todennäköisyyksien *tulo*.

Puutodennäköisyydet:

Tulosääntö 2/4

- Olkoon

$$L, A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$$

yksi niistä vaihtoehtoisista *tapahtumajonoista*, joista satunnaisilmiö muodostuu.

- Tällöin parit

$$(L, A_1), (A_1, A_2), (A_2, A_3), \dots, (A_{k-1}, A_k)$$

muodostavat satunnaisilmiön *alkutilasta* L satunnaisilmiön (*loppu-*) tilaan A_k vievän reitin särmät.

Puutodennäköisyydet:

Tulosääntö 3/4

- Liitetään reitin

$$(L, A_1), (A_1, A_2), (A_2, A_3), \dots, (A_{k-1}, A_k)$$

särmiin *todennäköisyydet* seuraavalla tavalla:

$$(L, A_1) \rightarrow \Pr(A_1) = p_1$$

$$(A_1, A_2) \rightarrow \Pr(A_2 | A_1) = p_2$$

$$(A_2, A_3) \rightarrow \Pr(A_3 | A_1 \cap A_2) = p_3$$

...

$$(A_{k-1}, A_k) \rightarrow \Pr(A_k | A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_{k-1}) = p_k$$

Puutodennäköisyydet:

Tulosääntö 4/4

- Reitin

$$(L, A_1), (A_1, A_2), (A_2, A_3), \dots, (A_{k-1}, A_k)$$

todennäköisyys on **yleisen tulosäännön** nojalla:


$$\begin{aligned} & \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_k) \\ &= \Pr(A_1) \times \Pr(A_2 | A_1) \times \Pr(A_3 | A_1 \cap A_2) \times \\ & \quad \dots \times \Pr(A_k | A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_{k-1}) \\ &= p_1 \times p_2 \times p_3 \times \dots \times p_k \end{aligned}$$

Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit

Puutodennäköisyydet:

Tulosäännön havainnollistus

- *Puutodennäköisyyksien tulosääntöä* voidaan havainnollistaa viereisellä *puudiagrammilla*.
- Reitin k todennäköisyys on puutodennäköisyyksien tulosäännön mukaan
$$\Pr(\text{Reitti } k) = p_1 p_2 p_3 \cdots p_k$$



Puutodennäköisyydet: Yhteenlaskusääntö 1/2

- Jos useita (loppu-) tiloja yhdistetään yhdeksi tapahtumaksi, näin saadun *yhdistetyn tapahtuman* todennäköisyys saadaan määräämällä ko. tiloihin vievien reittien todennäköisyyksien *summa*.
- Sääntöä kutsutaan **puutodennäköisyyksien yhteenlaskusäännöksi**.
- Yhteenlaskusäännön perustelu:
 - (1) Puun eri pisteisiin vievät reitit ovat *toisensa poissulkevia*.
 - (2) *Toisensa poissulkevien tapahtumien yhteenlaskusäännön mukaan* useista (loppu-) pisteistä yhdistämällä saatavan tapahtuman todennäköisyys saadaan määräämällä ko. pisteisiin vievien reittien todennäköisyyksien *summa*.

Puutodennäköisyydet: Yhteenlaskusääntö 2/2

- Yhdistetään satunnaisilmiön (*loppu-*) tilat B_1, B_2, \dots, B_k yhdeksi tapahtumaksi

$$C = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k$$

- Olkoot tiloja B_1, B_2, \dots, B_k vastaavat reitit

Reitti 1, Reitti 2, ..., Reitti k

- Koska puun eri pisteisiin vievät reitit ovat *toisensa poissulkevia*, tapahtuman C todennäköisyys on **toisensa poissulkevien tapahtumien yhteenlaskusäännön** nojalla:


$$\begin{aligned} \Pr(C) &= \Pr(\text{Reitti 1 tai Reitti 2 tai } \dots \text{ tai Reitti } k) \\ &= \Pr(\text{Reitti 1}) + \Pr(\text{Reitti 2}) + \dots + \Pr(\text{Reitti } k) \end{aligned}$$

Puutodennäköisyydet:

Yhteenlaskusäännön havainnollistus

- Puutodennäköisyyksien yhteenlaskusääntöä voidaan havainnollistaa viereisellä puudiagrammilla:*

$$\begin{aligned} \Pr(C) = & \Pr(\text{Reitti 1}) \\ & + \Pr(\text{Reitti 2}) \\ & \dots \\ & + \Pr(\text{Reitti } k) \end{aligned}$$



Puuverkkojen käyttö päätöstilanteissa: Esimerkki 1/6

- Tarkastellaan seuraavaa *päätöstilannetta*.
- *Munuaistaudissa* potilaan munuaiset lopettavat vähitellen toimintansa, mikä johtaa potilaan kuolemaan.
- Oletetaan, että potilas voisi vapaasti valita hoidoksi joko *dialyysin* (munuaiskoneen) tai *munuaisensiirron*.
- *Kumpi hoidoista potilaan kannattaa valita*, jos hoitojen tuloksista on käytettävissä seuraavalla kalvolla esitetyt tiedot?

Puuverkkojen käyttö päätöstilanteissa: Esimerkki 2/6

- Dialyysipotilaat:
 - 68 % elää 5:n vuoden kuluttua
 - 32 % on kuollut 5:n vuoden kuluttua
- Munuaisensiirtopotilaat:
 - 48 %:lla siirretty munuainen toimii normaalisti ja potilas elää 5:n vuoden kuluttua
 - 43 %:lla siirretty munuainen ei toimi kunnolla ja he joutuvat dialyysiin
 - 42 % näistä potilaista elää 5:n vuoden kuluttua
 - 58 % näistä potilaista on kuollut 5:n vuoden kuluttua
 - 9 % kuolee siirron aiheuttamiin komplikaatioihin

Puuverkkojen käyttö päätöstilanteissa: Esimerkki 3/6

- Merkitään:

D = ”Potilasta hoidetaan dialyysillä”

S = ”Potilaalle tehdään munuaisensiirto”

SD = ”Siirtopotilas joutuu dialyysiin”

E = ”Potilas elää 5 vuoden kuluttua”

K = ”Potilas on kuollut 5 vuoden kuluttua”

- Hoitotulokset voidaan esittää seuraavina *ehdollisina todennäköisyyksinä*:


$$\Pr(E|D) = 0.68 \quad \Pr(K|D) = 0.32$$

$$\Pr(E|S) = 0.48 \quad \Pr(SD|S) = 0.43 \quad \Pr(K|S) = 0.09$$

$$\Pr(E|SD) = 0.42 \quad \Pr(K|SD) = 0.58$$

Puuverkkojen käyttö päätöstilanteissa: Esimerkki 4/6

- Potilaalle tarjolla olevia vaihtoehtoja voidaan kuvata viereisellä *diagrammilla*, joka koostuu kahdesta *puudiagrammista*.
- Jos potilas haluaa *maksimoida* todennäköisyyden olla elossa 5:n vuoden kuluttua, hänen on *verrattava* reitin 1 määräämän tapahtuman todennäköisyyttä reittien 3 ja 4 määräämän yhdistetyn tapahtuman todennäköisyyteen.



Puuverkkojen käyttö päätöstilanteissa: Esimerkki 5/6

- Reitin 1 määräämään tapahtuman todennäköisyys:


$$\Pr(\text{Reitti 1}) = 0.68$$

- Reitin 3 määräämään tapahtuman todennäköisyys:

$$\Pr(\text{Reitti 3}) = 0.48$$

- Reitin 4 määräämään tapahtuman todennäköisyys on *puutodennäköisyyksien tulosäännön* mukaan:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{Reitti 4}) &= 0.43 \times 0.42 \\ &= 0.1806 \end{aligned}$$



Puuverkkojen käyttö päätöstilanteissa: Esimerkki 6/6

- Reittien 3 ja 4 määräämän yhdistetyn tapahtuman todennäköisyys on *puutodennäköisyyksien yhteenlaskusäännön* mukaan:

$$\Pr(\text{Reitti 3 tai Reitti 4})$$

$$= 0.48 + 0.1806$$


$$= 0.6606$$

- Koska

$$\Pr(\text{Reitti 3 tai Reitti 4}) = 0.6606$$

$$< \Pr(\text{Reitti 1}) = 0.68,$$

potilaan kannattaa valita dialyysi.



Verkot ja todennäköisyyslaskenta

Puudiagrammit todennäköisyyslaskennassa: Johdanto

Todennäköisyyslaskenta ja puudiagrammit

>> Toimintaverkot

Toimintaverkot

Avainsanat

Komponentti

Toimintatodennäköisyys

Toimintaverkko

Tulosääntö

Riippumattomuus

Rinnankytkentä

Sarjaankytkentä

Systeemi

Verkko

Yhteenlaskusääntö

Systemi ja sen toimintatodennäköisyys



- Tehtävänä on määrätä sellaisen **systemin toimintatodennäköisyys**, joka koostuu **komponenteista**, jotka on kytketty joko **sarjaan** tai **rinnan**.
- Tehdään komponenteista seuraavat oletukset:
 - (i) Jokaisen komponentin toimintatodennäköisyys *tunnetaan*.
 - (ii) Jokaisen komponentin toiminta (tai toimimattomuus) on *riippumatonta* muiden komponenttien toiminnasta.

Systemit ja toimintaverkot

- Sarjaan ja rinnan kytketyistä komponenteista koostuvia systeemejä voidaan kuvata **toimintaverkoilla**.
- Sarjaan- ja rinnankytkennöistä koostuvien toimintaverkkojen toimintatodennäköisyys voidaan *palauttaa* sarjaan- ja rinnankytkentöjen toimintatodennäköisyyksiin.

Sarjaankytkentä ja rinnankytkentä

- *Toimintaverkot* koostuvat sarjaan- ja rinnankytkennöistä.
- Alla olevat *kytkentäkaaviot* esittävät kahden komponentin K_1 ja K_2 muodostamia sarjaan- ja rinnankytkentöjä.



Sarjaankytkennän toiminta

- Merkitään

T = Komponentti *toimii*

F = Komponentti *ei toimi*

- Komponenttien K_1 ja K_2 sarjaankytkentä toimii, jos K_1 toimii ja K_2 toimii:

K_1	K_2	K_1 ja K_2
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Rinnankytkennän toiminta

- Merkitään

T = Komponentti *toimii*

F = Komponentti *ei toimi*

- Komponenttien K_1 ja K_2 rinnankytkentä toimii, jos K_1 toimii *tai* K_2 toimii *tai* molemmat toimivat:



K_1	K_2	K_1 tai K_2
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Sarjaan- ja rinnankytkentöjen toimintatodennäköisyydet 1/2

- Määritellään *tapahtumat* A_1 ja A_2 :
 $A_1 = \text{"Komponentti } K_1 \text{ toimii"}$
 $A_2 = \text{"Komponentti } K_2 \text{ toimii"}$
- Olkoot tapahtumien A_1 ja A_2 *todennäköisyydet*:
 $\Pr(A_1) = p_1$
 $\Pr(A_2) = p_2$
- *Sarjaankytkennän toimintatodennäköisyys* on
 $\Pr(A_1 \cap A_2)$
- *Rinnankytkennän toimintatodennäköisyys* on
 $\Pr(A_1 \cup A_2)$


Sarjaan- ja rinnankytkentöjen toimintatodennäköisyydet 2/2

- Määrätään komponenttien K_1 ja K_2 muodostamien *sarjaan- ja rinnankytkentöjen toimintatodennäköisyydet komponenttien K_1 ja K_2 toimintatodennäköisyyksien avulla.*



Sarjaankytkennän toimintatodennäköisyys 1/2


- Oletetaan, että toimintaverkko koostuu komponenteista K_1 ja K_2 , jotka on kytketty *sarjaan*.
- Olkoot
$$\Pr(K_1 \text{ toimii}) = p_1$$
$$\Pr(K_2 \text{ toimii}) = p_2$$
- Oletetaan, että tapahtumat ” K_1 toimii” ” K_2 toimii” ovat *riippumattomia*.



Sarjaankytkennän toimintatodennäköisyys 2/2


- Riippumattomien tapahtumien tulosäännön perusteella *sarjaankytkennän toimintatodennäköisyys* on $\Pr(K_1 \text{ toimii ja } K_2 \text{ toimii}) = p_1 p_2$

Sarjaankytkentä:



Rinnankytkennän toimintatodennäköisyys 1/2

- Oletetaan, että toimintaverkko koostuu komponenteista K_1 ja K_2 , jotka on kytketty *rinnan*.
- Olkoot
$$\Pr(K_1 \text{ toimii}) = p_1$$
$$\Pr(K_2 \text{ toimii}) = p_2$$
- Oletetaan, että tapahtumat ” K_1 toimii” ” K_2 toimii” ovat *riippumattomia*.



Rinnankytkennän toimintatodennäköisyys 2/2

- Yleisen yhteenlaskusäännön ja riippumattomien tapahtumien tulossäännön perusteella *rinnankytkennän toimintatodennäköisyys* on


$$\Pr(K_1 \text{ toimii tai } K_2 \text{ toimii})$$

$$= \Pr(K_1 \text{ toimii})$$

$$+ \Pr(K_2 \text{ toimii})$$

$$- \Pr(K_1 \text{ toimii ja } K_2 \text{ toimii})$$


$$= p_1 + p_2 - p_1 p_2$$



Toimintaverkot

Esimerkki 1/3

- Oletetaan, että toimintaverkko koostuu 4:stä komponentista K_1 , K_2 , K_3 , K_4 viereisen kaavion mukaisesti.
- Komponentit K_1 ja K_2 on kytketty *sarjaan*.
- Komponentit K_3 ja K_4 on kytketty *sarjaan*.
- Komponenttipari K_1 ja K_2 on kytketty *rinnan* komponenttiparin K_3 ja K_4 kanssa.



Toimintaverkot


Esimerkki 2/3

- Olkoon
 $\Pr(K_i \text{ toimii}) = p, i = 1, 2, 3, 4$
- Oletetaan lisäksi, että yhdenkään komponentin toiminta *ei riipu* muiden komponenttien toiminnasta.
- Edellä esitetyn nojalla:

$$\Pr(K_1 \text{ toimii ja } K_2 \text{ toimii}) \\ = p \times p = p^2$$

$$\Pr(K_3 \text{ toimii ja } K_4 \text{ toimii}) \\ = p \times p = p^2$$

$$\Pr(\text{Systemi toimii}) \\ = p^2 + p^2 - p^2 \times p^2 \\ = 2p^2 - p^4$$



Esimerkki 3/3

- Kuvio esittää esimerkin systeemin toimintatodennäköisyyttä

$$f(p) = 2p^2 - p^4$$

yksittäisen komponentin toimintatodennäköisyyden p funktiona.

- Kuviossa on myös suora $f(p) = p$.

- Kuvioista nähdään:

(i) $f(p)$ on p :n kasvava funktio.

(ii) Esimerkin systeemin toimintatodennäköisyys voi olla suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin yksittäisen komponentin toimintatodennäköisyys.

