

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Antti Rasila

8. marraskuuta 2007

- 1 Kertausta: momenttimenetelmä ja suurimman uskottavuuden menetelmä
- 2 Tilastollinen testaus
 - Yleinen hypoteesi
 - Nollahypoteesi
 - Vaihtoehtoinen hypoteesi
- 3 Testisuure
 - Testisuureen normaaliarvo
 - Virheet testauksessa
 - Testin tulos ja maailman tilat
- 4 Hylkäys- ja hyväksymisalueet
 - Merkitsevyystaso
 - Hylkäysalueen määrittäminen yksisuuntaisessa testissä
 - Hylkäysalueen määrittäminen kaksisuuntaisessa testissä
- 5 Tilastollisen testin suorittamisen vaiheet
- 6 p -arvo

Esimerkki (momenttimenetelmä)

- Tarkkaillaan peräkkäisten autojen aikaväliä (sekunteja) maantiellä. Oletetaan, että aikaväli X on eksponenttijakautunut parametrina λ . Tällöin $E(X) = 1/\lambda$.
- Tarkkailija havaitsi seuraavat aikavälin pituudet:
18 4 7 33 28 5 6 14 9 18
Havaintojen aritmeettinen keskiarvo on $142/10=14.2$.
- Asetetaan odotusarvo ja aritmeettinen keskiarvo yhtäsuuriksi ja ratkaistaan λ : $1/\lambda = 14.2$, joten $\lambda = 0.0704$.
- Peräkkäisten autojen väliaikaa siis kuvaa parhaiten (y.o. aineiston perusteella) se eksponenttijakauma, jonka tiheysfunktio on

$$f_X(x) = 0.0704 \cdot e^{-0.0704x}.$$

Esimerkki (suurimman uskottavuuden menetelmä)

- Sovitetaan edellisen esimerkin havaintoihin eksponenttijakauma $f_X(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$.
- Havaintoaikojen summa on 142.
- Likelihood-funktioksi tulee

$$L(\lambda) = \lambda e^{-\lambda 18} \lambda e^{-\lambda 4} \dots \lambda e^{-\lambda 18} = \lambda^{10} e^{-142\lambda}.$$

- Asetetaan derivaatta nolaksi, jolloin saadaan

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} L(\lambda) = 10\lambda^9 e^{-142\lambda} - 142\lambda^{10} e^{-142\lambda} = 0.$$

- Derivaatta on nolla arvolla $\lambda = 10/142 = 0.0704$. Päädyttiin samaan ratkaisuun kuin momenttimenetelmällä.

- *Tilastollisessa testauksessa* tutkitaan tutkimuskohteita koskevien oletusten tai väitteiden paikkansapitävyyttä havaintojen avulla.
- Testattavat oletukset tai väitteet tulee muotoilla tutkimuskohteiden tutkittavaa ominaisuutta kuvaavaa jakaumaa tai sen parametreja koskeviksi *hypoteeseiksi*.
- Testausasetelma kiinnitetään tekemällä seuraavat kolme oletusta:
 - (i) Testausasetelmaa koskevia yleisiä oletuksia kutsutaan testin *yleiseksi hypoteesiksi*.
 - (ii) Testattavaa väitettä tai oletusta kutsutaan testin *nollahypoteesiksi*.
 - (iii) Jos nollahypoteesi hylätään testissä, astuu voimaan *vaihtoehtoinen hypoteesi*.

- *Yleinen hypoteesi H* sisältää oletukset
 - perusjoukosta
 - käytetystä otantamenetelmästä
 - perusjoukon jakaumasta
- Yleisen hypoteesin oletuksista pidetään kiinni koko testauksen ajan.
- Yleisen hypoteesin sisältämiä jakaumaoletuksia voidaan ja on yleensä syytä testata erikseen.

- Testattavaa perusjoukon jakauman parametreja koskevaa väitettä tai oletusta kutsutaan *nollahypoteesiksi* ja merkitään H_0 .
- Nollahypoteesi H_0 hyväksytään, elleivät havaintojen sisältämät todisteet nollahypoteesia vastaan ole kyllin voimakkaita.
- Yksinkertaisissa testausasetelmissä nollahypoteesi on muotoa

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

Vaihtoehtoinen hypoteesi

- *Vaihtoehtoinen hypoteesi* H_1 on oletus, joka astuu voimaan, jos nollahypoteesi H_0 hylätään.
- Vaihtoehtoista hypoteesia, joka on muotoa

$$H_1 : \theta > \theta_0 \text{ tai muotoa } H_1 : \theta < \theta_0$$

kutsutaan *yksisuuntaiseksi*.

- Muotoa

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

olevaa vaihtoehtoista hypoteesia kutsutaan *kaksisuuntaiseksi*.

- Tilastollinen testi perustuu *testisuureeseen*, joka mittaa havaintojen ja nollahypoteesin H_0 yhteensopivuutta.
- Testisuure on satunnaismuuttuja, jonka arvo riippuu havainnoista ja nollahypoteesista H_0 .
- Havaintojen ja nollahypoteesin H_0 yhteensopivuuden mittaaminen tarkoittaa sitä, että tutkitaan kuinka todennäköistä on saada sellaisia testisuureen arvoja kuin on saatu, ehdolla että H_0 pätee.
- Yhteensopivuuden mittaaminen vaatii siis *testisuureen jakauman* tuntemista.

- Testisuuren odotusarvoa nollahypoteesin H_0 pätiessä kutsutaan testisuuren *normaaliarvoksi*.
- Jos testisuuren havaittu arvo on lähellä normaaliarvoa, havainnot ovat sopusoinnussa nollahypoteesin H_0 kanssa.
- Jos testisuuren havaittu arvo poikkeaa merkitsevästi normaaliarvosta, havainnot sisältävät todisteita nollahypoteesia H_0 vastaan.

- Jos nollahypoteesi H_0 hylätään silloin kun se on tosi, tehdään *hylkäysvirhe*.
- Hylkäysvirheen todennäköisyys α on muotoa

$$Pr(H_0 \text{ hylätään} | H_0 \text{ on tosi}) = \alpha$$

- Jos nollahypoteesi H_0 jätetään voimaan silloin kun se ei ole tosi, tehdään *hyväksymisvirhe*.
- Hyväksymisvirheen todennäköisyys β on muotoa

$$Pr(H_0 \text{ jätetään voimaan} | H_0 \text{ ei ole tosi}) = \beta$$

- Hylkäysvirhettä kutsutaan usein *ensimmäisen lajin virheeksi*. Tällöin hyväksymisvirhettä kutsutaan *toisen lajin virheeksi*.

Testin tulos ja maailman tilat

Maailman tilat ja testin tulos voidaan ryhmitellä seuraavaksi nelikentäksi:

		Maailman tila	
		Nollahypoteesi pätee	Nollahypoteesi ei päde
Testin tulos	Nollahypoteesi jää voimaan	Oikea johtopäätös	Hyväksymisvirhe
	Nollahypoteesi hylätään	Hylkäysvirhe	Oikea johtopäätös

- Jaetaan testisuureen saamien mahdollisten arvojen joukko kahteen osaan:
 - (i) Jos testisuureen havainnoista laskettu arvo joutuu *hylkäysalueelle*, niin nollahypoteesi H_0 hylätään.
 - (ii) Jos testisuureen havainnoista laskettu arvo joutuu *hyväksymisalueelle*, niin nollahypoteesi H_0 hyväksytään.
- Jos testisuureen havaittu arvo joutuu nollahypoteesin H_0 pätiessä hylkäysalueelle, niin seuraksena on hylkäysvirhe. Tämän todennäköisyys on α .

Merkitsevyystaso

- Testin *merkitsevyystaso* α on todennäköisyys sille, että testisuureen havainnoista laskettu arvo on hylkäysalueella, vaikka nollahypoteesi H_0 pätee.
- Merkitsevyystaso α on siis hylkäysvirheen todennäköisyys.
- *Tavanomaiset merkitsevyystasot* ovat

$$\alpha = 0.05$$

$$\alpha = 0.01$$

$$\alpha = 0.001$$

- (i) Jos nollahypoteesti voidaan hylätä merkitsevyystasolla $\alpha = 0.05$, sanotaan, että testin tulos on *melkein merkitsevä*.
- (ii) Jos nollahypoteesti voidaan hylätä merkitsevyystasolla $\alpha = 0.01$, sanotaan, että testin tulos on *merkitsevä*.
- (iii) Vastaavasti, jos nollahypoteesti voidaan hylätä merkitsevyystasolla $\alpha = 0.001$, sanotaan, että testin tulos on *erittäin merkitsevä*.

Hylkäysalueen määrittäminen yksisuuntaisessa testissä

- Olkoon parametria θ koskeva nollahypoteesi muotoa $H_0 : \theta = \theta_0$.
- olkoon testisuurena satunnaismuuttuja Z , jonka mahdolliset arvot ovat välillä (a, b) .
- Jos vaihtoehtoinen hypoteesi on muotoa $H_1 : \theta > \theta_0$, on hylkäysalue (yleensä) väli (u, b) , jossa *kriittinen raja* u määrätään siten, että

$$Pr(Z \geq u | H_0) = \alpha$$

- Jos vaihtoehtoinen hypoteesi on muotoa $H_1 : \theta < \theta_0$, on hylkäysalue (yleensä) väli (a, l) , jossa *kriittinen raja* l määrätään siten, että

$$Pr(Z \leq l | H_0) = \alpha$$

- Jos vaihtoehtoinen hypoteesi on muotoa $H_1 : \theta \neq \theta_0$, on hylkäysalue (yleensä) joukko $(a, l) \cup (u, b)$, jossa *kriittiset rajat* l ja u määrätään siten, että

$$Pr(Z \geq u | H_0) = Pr(Z \leq l | H_0) = \alpha/2$$

- **Huom.** Jos testisuureen Z jakauma on symmetrinen origon suhteen, pätee kriittisille rajoille

$$l = -u$$

Hylkäysalueen määrittäminen yksisuuntaisessa testissä

- Tilastollisen testin suorittaminen sisältää seuraavat vaiheet:
 - (1) Asetetaan testin *hypoteesit*.
 - (2) Valitaan *testisuure*.
 - (3) Valitaan *merkitsevyystaso* α ja muodostetaan sitä vastaava *hylkäysalue*.
 - (4) Poimitaan *otos* niin, että yleisen hypoteesin oletukset pitävät.
 - (5) Lasketaan *testisuureen arvo* havainnoista.
 - (6) Tehdään *päätös* nollahypoteesin hylkäämisestä.

- Nollahypoteesin H_0 hyväksyminen tai hylkääminen voidaan perustaa etukäteen valitun merkitsevyystason ja sitä vastaavan hylkäysalueen sijasta testin p -arvoon.
- Testin p -arvo on pienin merkitsevyystaso, jolla nollahypoteesi hylätään.
- Testin p -arvo määritetään:
 - (i) Lasketaan testisuureen arvo havainnoista.
 - (ii) Määrätään (olettaen, että H_0 pätee) todennäköisyys sille, että testisuure saa (normaaliarvoon verrattuna) niin poikkeuksellisen arvon kuin se on saanut tai vielä poikkeuksellisempia arvoja.
- Nollahypoteesi hylätään, jos p -arvo on kyllin pieni.