

Mat-1.433/443 Matematiikan peruskurssi K3/P3 syksy 2005

<http://www.math.hut.fi/teaching/k3/>

Laskuharjoitus 11 AV/12 LV (viikko 49, 5 – 9.12.2005)

Tämä on viimeinen varsinainen harjoitustehtäväkokoelma. Viikon 49 harjoitukset pidetään nyt kääntäen niin, että AV on neuvontaharjoitus ja LV on kotilaskuharjoitus. Syy: Itsenäisyyspäivä (ti) tuhoaa useita harjoitusryhmiä. Silloin ti-ryhmäläiset voivat vieraillla haluamassaan ryhmässä tiistain komplementissa.

Viimeiset luennot (to–pe 8–9.12) pidetään esimerkki- ja kertauspainotteisina, koska niillä esitetyt asioita ei ehditä käsitellä harjoituksissa. Näillä luennoilla esitetyt tehtävät rinnastetaan harjoitustehtäviin koevaatimuksissa. Luentotehtäväkooste pyritään jakamaan etukäteen.

Viitteet: KRE Ch 10.6, 11.1 – 11.5, 19.4.

Alkuviikko (Neuvonta)

1. Määritä vaimentamatonta värähtelysysteemiä kuvaavan yhtälön $y'' + \omega^2 y = r(t)$ “tasapainoratkaisu”, jolla tässä tarkoitetaan AE:n $y(0) = 0$ toteuttavaa ratkaisua, kun herätteenä $r(t)$ on 4-jaksoinen funktio, joka välillä $[0, 4]$ on $r(t) = \begin{cases} 30, & 0 < t < 2 \\ -30, & 2 < t < 4 \end{cases}$.

Olkoon $\omega = 3$. Määritä ratkaisusarjan dominoiva komponentti, ts. termi, jonka amplitudi on huomattavasti muita suurempi (jos sellainen on).

Ohje: Kehitä $r(t)$ Fourier-sarjaksi, etsi sarjan yleistä termiä vastaava dif-
fyhtälön ratkaisu y_n ja muodosta $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$

2. (a) Osoita, että funktiot $u_1(x, t) = e^{-\pi^2 c^2 t} \sin(\pi x)$, $u_3(x, t) = e^{-9\pi^2 c^2 t} \sin(3\pi x)$ ja $u = 4u_1 - 1/3u_3$ toteuttavat lämpöyhtälön $u_t = c^2 u_{xx}$ alueessa $0 < x < 1$ ja $t > 0$ ja nollareunaehdot (kohdissa $x = 0$ ja $x = 1$).
Hahmottele alkulämpötilan $u(x, 0)$ kuvaaja välillä $0 \leq x \leq 1$.
3. Ratkaise π :n pituista sauvaa koskeva lämpöyhtälö $u_t = u_{xx}$ ($c^2 = 1$), kun sauvan päät “upotetaan jäihin” (eli pidetään $0^\circ C$:ssa) ja alkulämpötilajakauma on $f(x) = 50 \sin x - 6 \sin 2x + 8 \sin 5x$.

Suorita tehtävä käymällä muuttujanerotteluprosessi alusta alkaen läpi. (Ei tarvitse käyttää aikaa ”sen erään vakion” negatiivisuuserusteluun.) Tässä et tarvitse Fourier-sarjaa (miksi?)

4. Kuparisauva ($c^2 = 1.14$), jonka pituus $L = 10$ cm upotetaan kiehuvan veteen, kunnes sen lämpötila on kauttaaltaan $100^\circ C$. Hetkellä $t = 0$ sauvaa otetaan vedestä, lämpöeristetään täydellisesti pituussuunnassa ja sen päät työnnetään jäävesisäiliöihin $0^\circ C$.

Muodosta sauvan lämpötilafunktio $u(x, t)$.

Arvioi sarjan ensimmäistä termiä käyttäen, kuinka pitkän ajan t_1 kuluttua sauvan maksimilämpötila (keskipisteen lämpötila) on pudonnut puoleen.

Loppuviikko (Kotilaskut)

1. Sauva, joka on myös päistään lämpöeristetty, johtaa “adiabaattisiin reunaehtoihin”: $u_x(0, t) = 0$, $u_x(L, t) = 0$.

Määritä tällaisen täysin eristetyn, $L = \pi$ -pituisen sauvan lämpötilafunktio $u(x, t)$, kun alkuehtofunktio $f(x) = 1 - \frac{x}{\pi}$, $x \in (0, \pi)$.

Määritä ajasta riippumaton tasapainolämpötila $u_\infty(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t)$.

2. Ohuen neliönmuotoisen kuparilevyn pinnat on lämpöeristetty (reunoja lukuunottamatta). Olkoon neliön sivu $a = 24$. Yläreuna pidetään $20^\circ C$ -asteessa ja muut reunat 0° :ssa. Määritä tasapainolämpötilajakauma $u(x, y)$, toisin sanoen, ratkaise Laplacen yhtälö $\Delta u = 0$.
3. Olkoon värähtelevän kielen pituus $L = \pi$ pituusyksikköä, ja olkoon aaltoyhtälön vakiokerroin $c^2 = 1$.

Määritä ratkaisu, jonka alkunopeus = 0 ja alkupoikkeama $u(x, 0) = k \sin x - \frac{1}{2} \sin 2x$.

Ohje: Käy kursorisesti läpi muuttujanerotteluvaiheet, yksityiskohtia reunaehtopäätelyiden suhteen ei tarvitse laskea, vaan voit ottaa suoraan kirjasta tai luentomuistiinpanoista tulomuotoiset kantafunktiot $u_k(x, t)$ paneudu sensijaan huolellisesti alkuehdon määräämiseen. Huomaa, että tässä ei tarvita sarjaa, vaan äärellinen lineaarikombinaatio riittää (ja paistaa läpi).

Kirjoita lopuksi (trigonometrian kaavoja hyödyntäen) ratkaisu muotoon $\frac{1}{2}(f(x-t) + f(x+t))$.

(Voit merkitä tehtävän ilmankin tätä loppukaneettia)

4. Olkoon värähtelevän kielen pituus L , ja olkoon aaltoyhtälön c mukana ihan c :nä. Määritä ratkaisu $u(x, t)$, kun alkunopeus $= 0$ ja alkupoikkema $u(x, 0) = x(L - x)$

Suositus: Käytä mielellään MAPLE:a integrointiin, kts. ohjeita.


Vast: $u(x, t) = \frac{8L^2}{\pi^3} \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^3} \sin \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{n\pi ct}{L}$.

5. Kirjoita edellisen tehtävän ratkaisu muotoon $u(x, t) = f^*(x - ct) + f^*(x + ct)$, missä f^* on alkuehtofunktion $f(x) = u(x, 0)$ pariton $2L$ - jaksoinen laajennus.

Ohje: Käytä tuttuja trigonometrisia kaavoja

6. (a) Muodosta kuvan neliöalueella Laplacen yhtälön $\Delta u = 0$ differenssimenetelmäratkaisun yhtälösystemi $Au = b$. Tämän ratkaisuvektori $u = [u_1, u_2, u_3, u_4]^T$ antaa siis approksimaatiot ratkaisufunktion arvoille näissä hila(sisä) pisteissä.

Reuna-arvoina ovat vektorit o, y, v, a (oikea, ylä, vasen, ala).



- (b) Olkoon kuvan alue neliö $[0, 3] \times [0, 3]$ ja askel $h = 1$. Olkoot u :n reuna-arvot annettu näin: Vasen reuna: $u = 0$, alareuna: $u = x^3$, oikea reuna: $u = 27 - 9y^2$, yläreuna: $u = x^3 - 27x$.

Määritä potentiaalifunktion (tai tasapainolämpötilan) $u(x, y)$ likiarvot sisäpisteissä $(1, 1), (2, 1), (1, 2), (2, 2)$.

Ohje: Saat halutessasi käyttää 4×4 - yhtälösystemiin MATLAB:n "takakenoa": `>> u=A\b` tai MAPLE:n `LinearSolve`:a (sitä ennen `with(LinearAlgebra):`), toki symmetrian takia käsinlaskukaan ei ole työläs.

Ohjeita

Aaltoyhtälö (1-ulotteinen): $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ (hyperbolinen)

Lämpö/diffuusioyhtälö (1-ulotteinen): $u_t = c^2 u_{xx}$ (parabolinen)

Laplacen yhtälö: $\nabla^2 u = 0$ (2- tai 3-ulotteinen) (elliptinen)

Poissonin yhtälö: $\nabla^2 u = f$ (2- tai 3-ulotteinen).

(Muista: $\Delta = \nabla^2$)

LV teht. 4: Ota vaikka mallia tiedostosta:

<http://math.tkk.fi/teaching/k3/05/L/fouriersarjat.html> tai kirjoita MAPLE:lle rohkeasti tyyliin:

```
bn:=(1/Pi)*int(f(x)*sin(n*x),x=-Pi..Pi);
```

Käsinlaskijalle annamme Maplen generoiman integraalikaavan (tässä jätetään sijoitusten suorittaminen lukijalle):

$$\int x(L-x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = L(L^2 n\pi - 2n\pi xL) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) n^{-3} \pi^{-3} + L(-Ln^2 \pi^2 x + n^2 \pi^2 x^2 - 2L^2) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) n^{-3} \pi^{-3}$$

Trigonometriaa

$$\begin{cases} \sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \end{cases}$$

Fourier-kertoimet, f määritelty välillä $(-L, L)$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$