

SUPREMUM JA INFIMUM

$\sup A$ eli reaalijoukon A supremum on maksimin yleistys jolla on se hyvä ominaisuus, että se on aina olemassa. Vastaavasti, $\inf A$ eli A :n infimum on minimin yleistys.

Jos $A \subset \mathbb{R}$ niin $\sup A = a$, missä $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$
mikäli $x \leq a$ kaikilla $x \in A$ ja
jos $\alpha < a$ niin löytyy $x \in A$ siten, että $x > \alpha$.
 $\sup A$ eli A :n supremum on joukon A pienin yläraja.

Jos joukossa $A \subset \mathbb{R}$ on suurin arvo a , eli $\max A = a$ niin
 $\sup A = a$

Jos $A \subset \mathbb{R}$ niin $\inf A = b$, missä $b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$
mikäli $x \geq b$ kaikilla $x \in A$ ja
jos $\beta > b$ niin löytyy $x \in A$ siten, että $x < \beta$.
 $\inf A$ eli A :n infimum on joukon A suurin alaraja.

Jos joukossa $A \subset \mathbb{R}$ on pienin arvo b , eli $\min A = b$ niin
 $\inf A = b$

Jos $\emptyset$ on tyhjä joukko niin
 $\sup \emptyset = -\infty$ ja $\inf \emptyset = +\infty$

RAJA-ARVOT

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L :$$

Jos $|x - x_0|$ on ”riittävän pieni” ja $x \neq x_0$ niin $|f(x) - L|$ on ”pieni”

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} f(x) = L :$$

Kaikilla $\epsilon > 0$ on olemassa $\delta > 0$ siten, että
jos $0 < |x - x_0| < \delta$ ja $x \in \Omega$ niin $|f(x) - L| < \epsilon$

$$\text{Jos } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} f(x) = F \text{ ja } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} g(x) = G \text{ niin}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} (\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha F + \beta G,$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} f(x)g(x) = FG,$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{F}{G}, \text{ mikäli } G \neq 0,$$

$F \leq G$ mikäli $f(x) \leq g(x)$ kun $0 < |x - x_0| < c$ missä $c > 0$.

$$\text{Jos } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \text{ ja } |f(x)| \leq g(x)$$

kun $0 < |x - x_0| \leq c$ missä $c > 0$ niin

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

$$\text{Jos } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L \text{ ja } g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

kun $0 < |x - x_0| \leq c$ missä $c > 0$ niin

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

$$\text{Jonon } (a_n) \text{ raja-arvo } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L:$$

Kaikilla $\epsilon > 0$ on olemassa $N_0 \in \mathbb{N}$ siten, että

jos $n > N_0$ niin $|a_n - L| < \epsilon$

$$\text{Raja-arvo } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ ei ole olemassa jos}$$

löytyy kaksi jonoa (a_n) ja (b_n) siten, että

$$a_n \neq x_0 \text{ ja } b_n \neq x_0 \text{ kaikilla } n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x_0 \text{ ja}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A \text{ ja } \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = B \text{ missä } A \neq B$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in (x_0, \infty)}} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in (-\infty, x_0)}} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = L$$

$$\begin{aligned} &\text{Jos } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = F, \lim_{y \rightarrow F} g(y) = G \text{ ja} \\ &g(F) = G \text{ tai } f(x) \neq F \text{ kun } x \neq x_0, \text{ niin} \\ &\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow F} g(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L, (L \in \mathbb{R}): \\ &\forall \epsilon > 0 \exists p \in \mathbb{R} : x > p \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L, (L \in \mathbb{R}): \\ &\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{R} : x < n \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty, (x_0 \in \mathbb{R}): \\ &\forall P \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > P \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, (x_0 \in \mathbb{R}): \\ &\forall N \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty: \\ &\forall N \in \mathbb{R} \exists p \in \mathbb{R} : x > p \Rightarrow f(x) < N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Jos } a > 0 \text{ niin } a \cdot \infty = \infty \\ &\infty + \infty = \infty \quad \infty \cdot \infty = \infty \\ &(-a) \cdot \infty = -\infty \quad \frac{a}{\infty} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &0 \cdot \infty = ? \quad \infty - \infty = ? \\ &\frac{0}{0} = ? \quad \frac{\infty}{\infty} = ? \\ &\frac{a}{0} = ? (\pm \infty) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0+} f\left(\frac{1}{x}\right) = L$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0+} f\left(-\frac{1}{x}\right) = L$$

$$\begin{aligned} &\text{Jos } f(x) > 0 \text{ kun } x \in \Omega \text{ niin} \\ &\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} f(x) = \infty \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} \frac{1}{f(x)} = 0 \end{aligned}$$

JATKUVUUS

Funktio $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva pisteessä x_0 jos

$$x_0 \in \Omega \text{ ja } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} f(x) = f(x_0)$$

Funktio $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva (Ω :ssa) jos

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \Omega}} f(x) = f(x_0) \text{ kaikilla } x_0 \in \Omega$$

Jos $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ja $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ovat jatkuvia, niin $\alpha f(x) + \beta g(x)$ ja $f(x)g(x)$ ovat jatkuvia Ω :ssa ja

$$\frac{f(x)}{g(x)} \text{ on jatkuva joukossa } \{x \in \Omega \mid g(x) \neq 0\}$$

Jos $f : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ ja $g : \mathcal{D}_g \rightarrow \mathbb{R}$ ovat jatkuvia

ja $g(x) \in \mathcal{D}_f$ kaikilla $x \in \mathcal{D}_g$, niin

yhdistetty funktio $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ on jatkuva: $\mathcal{D}_g \rightarrow \mathbb{R}$

Bolzanon merkinvaihtolause

Jos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva ja $f(a)f(b) \leq 0$

niin on olemassa piste $x_0 \in [a, b]$ siten, että $f(x_0) = 0$

Jos f on jatkuva välillä $[a_0, b_0]$ ja $f(a_0)f(b_0) < 0$ ja jos

$$\begin{cases} a_{j+1} = a_j, \\ b_{j+1} = \frac{a_j + b_j}{2}, \end{cases} \quad \text{jos } f(a_j)f\left(\frac{a_j+b_j}{2}\right) < 0,$$
$$\begin{cases} a_{j+1} = \frac{a_j + b_j}{2}, \\ b_{j+1} = b_j, \end{cases} \quad \text{jos } f(a_j)f\left(\frac{a_j+b_j}{2}\right) > 0,$$

$$\text{ja } a_{j+1} = b_{j+1} = \frac{a_j + b_j}{2} \text{ jos } f\left(\frac{a_j+b_j}{2}\right) = 0,$$

niin on olemassa piste $x_0 \in [a_j, b_j]$, $j \geq 1$ siten, että $f(x_0) = 0$

Jatkuva funktio saavuttaa suurimman ja pienimmän arvonsa suljetulla ja rajoitetulla välillä:

Jos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva niin

on olemassa pisteet x_1 ja $x_2 \in [a, b]$ siten, että

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \quad x \in [a, b]$$

$$\text{eli } f(x_1) = \inf_{x \in [a, b]} f(x) = \min_{x \in [a, b]} f(x) \text{ ja } f(x_2) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

Polynomi $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots a_0$,
missä $n \in \mathbb{N}$ on luonnollinen luku, on jatkuva joukossa $\mathbb{R}$

Rationaalifunktio $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ missä P ja Q ovat polynomeja
on jatkuva määrittelyjoukossaan $\{ x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0 \}$

DERIVAATTA

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

f on derivoituva $\Leftrightarrow$ raja-arvo on olemassa ja on äärellinen.
Voidaan puhua funktion f derivaatasta pisteessä x ainoastaan jos f on määritelty joukossa, joka sisältää välin $(x - \delta, x + \delta)$ missä δ on jokin (pieni) positiivinen luku

$$f'(x) = \frac{d}{dx}f(x) = Df(x) = D_x f(x)$$

$$\begin{aligned}(\alpha f + \beta g)'(x) &= \alpha f'(x) + \beta g'(x) \\ (fg)'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ \left(\frac{f}{g}\right)'(x) &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} \\ h(x) = f(g(x)) &\Rightarrow h'(x) = f'(g(x))g'(x)\end{aligned}$$

Jos f on derivoituva pisteessä x niin f on jatkuva pisteessä x

$$\frac{d}{dx}x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}$$

Derivaatta on tangentin kulmakerroin

Derivaatta on muutosnopeus

$$\begin{aligned}f'_+(x) &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f'_-(x) &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f \text{ on derivoituva pisteessä } x &\Leftrightarrow \\ f'_+(x) \text{ ja } f'_-(x) \text{ ovat olemassa ja } f'_+(x) &= f'_-(x)\end{aligned}$$

f on *jatkuvasti derivoituva* jos f on derivoituva ja f' on jatkuva

$$\begin{aligned}(f')'(x) = f''(x) &= \frac{d}{dx} \frac{d}{dx} f(x) = \frac{d^2}{dx^2} f(x) = D^2 f(x) \\ f^{(n)}(x) &= \frac{d^n}{dx^n} f(x) = D^n f(x)\end{aligned}$$

OSITTAISDERIVAATAT JA IMPLISIITTINEN DERIVOINTI

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} \\f_y(x, y) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_x &= \frac{\partial f}{\partial x} = D_x f = f_1 = D_1 f \dots \\f_{xy} &= (f_x)_y = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\end{aligned}$$

Implisiittinen derivointi:

Jos $F(x_0, y_0) = 0$, $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ ja F sekä F_y ovat jatkuvia niin

$F(x, y(x)) = 0$ (kun $|x - x_0|$ on riittävän pieni),

$$y(x_0) = y_0 \text{ ja } y'(x_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}$$

VÄLIARVOLAUSE JA DERIVAATAN SOVELLUTUKSIA

Optimoinnin peruslause:

Jos f on derivoituva pisteessä x_0 ja
 $f(x) \leq f(x_0)$ kun $|x - x_0| < \delta$ missä $\delta > 0$ niin
 $f'(x_0) = 0$

eli paikallisessa maksimipisteessä (tai minimipisteessä) derivaatta on 0.

Rollen lause:

Jos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva, f on derivoituva välillä (a, b) ja $f(a) = f(b)$ niin
on olemassa $c \in (a, b)$ siten, että $f'(c) = 0$

Väliarvolause:

Jos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva ja f on derivoituva välillä (a, b) niin
on olemassa $c \in (a, b)$ siten, että $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

Lineaarinen approksimaatio:

$$f(x + h) \approx f(x) + f'(x)h$$

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ on ei-vähenevä jos $f(x_1) \geq f(x_2)$ kun $x_1 > x_2$ ja $x_1, x_2 \in I$
 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ on aidosti kasvava jos $f(x_1) > f(x_2)$ kun $x_1 > x_2$ ja $x_1, x_2 \in I$
 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ on ei-kasvava jos $f(x_1) \leq f(x_2)$ kun $x_1 > x_2$ ja $x_1, x_2 \in I$
 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ on aidosti vähenevä jos $f(x_1) < f(x_2)$ kun $x_1 > x_2$ ja $x_1, x_2 \in I$

$$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f \text{ on ei-vähenevä}$$

$$f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow f \text{ on ei-kasvava}$$

$f'(x) \geq 0$ eikä (identtisesti) 0 millään avoimella välillä $\Leftrightarrow f$ on aidosti kasvava
 $f'(x) \leq 0$ eikä (identtisesti) 0 millään avoimella välillä $\Leftrightarrow f$ on aidosti vähenevä

KÄÄNTEIS JA TRANSKENDENTTIFUNKTIOT

Jos $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ on aidosti kasvava (vähenevä) ja jatkuva, niin on olemassa aidosti kasvava (vähenevä) ja jatkuva funktio g s.e.

$$g(f(x)) = x, \quad x \in I, \quad f(g(y)) = y, \quad y \in J,$$

$$\text{missä } J = \{ y \in \mathbb{R} \mid y = f(x) \text{ jollakin } x \in I \}$$

ja I sekä J ovat välejä

$$g(f(x)) = x \Rightarrow g'(f(x))f'(x) = 1 \Rightarrow g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$f(g(y)) = y \Rightarrow f'(g(y))g'(y) = 1 \Rightarrow g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}$$

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

$$e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^0 = 1$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^m e^{-x} = 0$$

$$\ln(e^x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$e^{\ln(x)} = x, \quad x > 0$$

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha \ln(x) = 0, \quad \alpha > 0$$

$$a^b = e^{b \ln(a)}$$

$$\arcsin(\sin(x)) = x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\sin(\arcsin(x)) = x, \quad x \in [-1, 1]$$

$$\frac{d}{dx} \arcsin(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arctan(\tan(x)) = x, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\tan(\arctan(x)) = x, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{d}{dx} \arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\begin{aligned}\arccos(\cos(x)) &= x, & x \in [0, \pi] \\ \cos(\arccos(x)) &= x, & x \in [-1, 1] \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \arccos(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sinh(x) &= \frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2} \\ \cosh(x) &= \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2} \\ \tanh(x) &= \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}\end{aligned}$$

VAKIOKERTOIMISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT

Jos on ratkaistava differentiaaliyhtälö

$$y'(t) + ay(t) = 0$$

niin kokeillaan sijoittamalla y :n paikalle $y(t) = e^{rt}$ jolloin saadaan

$$re^{rt} + ae^{rt} = 0$$

Koska $e^{rt} \neq 0$ niin supistamalla saadaan

$$r + a = 0$$

josta seuraa, että $r = -a$. Ratkaisuksi kelpaa siis e^{-at} ja yleisemmin

$$y(t) = ce^{-at}$$

Jos on ratkaistava differentiaaliyhtälö

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0$$

niin kokeillaan sijoittamalla y :n paikalle $y(t) = e^{rt}$ jolloin saadaan supistuksen jälkeen karakteristinen yhtälö

$$r^2 + ar + b = 0$$

Ratkaistaan tämä yhtälö ja olkoot ratkaisut r_1 ja r_2 .

Differentiaaliyhtälön yleinen ratkaisu on

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} \quad \text{jos} \quad r_1, r_2 \in \mathbb{R}, r_1 \neq r_2,$$

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 t e^{r_1 t} \quad \text{jos} \quad r_1 = r_2 \in \mathbb{R},$$

$$y(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t) \quad \text{jos} \quad r_1, r_2 = \alpha \pm i\beta.$$

ÄÄRIARVOT

Jos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva niin on olemassa x_1 ja $x_2 \in [a, b]$ s.e.

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \quad x \in [a, b],$$

$x_1, x_2 \in \{a\} \cup \{b\} \cup \{x \in (a, b) \mid f \text{ ei ole derivoituva pisteessä } x\}$

$$\cup \{x \in (a, b) \mid f'(x) = 0\}$$

Jos $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on derivoituva, $x_0 \in (a, b)$,

$$f'(x_0) = 0 \text{ ja } f''(x_0) > 0 \text{ niin}$$

on olemassa $\delta > 0$ siten että

$$f(x) \geq f(x_0) \text{ kun } |x - x_0| < \delta \text{ ja } x \in (a, b).$$

Jos $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva ja on olemassa $x_0 \in (a, b)$ s.e.

$$f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow a+} f(x), \quad f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$$

niin on olemassa $x_1 \in (a, b)$ s.e.

$$f(x_1) \leq f(x), \quad x \in (a, b),$$

$x_1 \in \{x \in (a, b) \mid f \text{ ei ole derivoituva pisteessä } x\}$

$$\cup \{x \in (a, b) \mid f'(x) = 0\}$$

KONVEKSISUUS

Jos $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on kaksi kertaa derivoituva, niin f on **konvekxi** jos jokin, ja silloin jokainen muukin, seuraavista ehdoista on voimassa

$$(1) \quad f((1-t)x_0 + tx_1) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1), \quad t \in [0, 1], \quad x_0, x_1 \in (a, b)$$

eli funktion arvo keskiarvopisteessä $\leq$ funktion arvojen keskiarvo

$$(2) \quad f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad x, x_0 \in (a, b)$$

eli funktion kuvaaja on tangentin yläpuolella

$$(3) \quad f'(x) \text{ on ei-vähenevä funktio välillä } (a, b)$$

$$(4) \quad f''(x) \geq 0, \quad x \in (a, b)$$

Jos $-f$ on konvekxi, niin f on konkaavi

NEWTONIN MENETELMÄ

Newtonin menetelmä: $f(x) = 0 \Rightarrow x = ?$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Suppenee nopeasti jos $|f''(x)| \leq C$ ja $|f'(x)| \geq c > 0$

Kiintopisteiteraatio: $x = g(x) \Rightarrow x = ?$

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

Suppenee ainakin jos $|g'(t)| \leq K < 1$

Yhtälön $f(x) = 0$ ratkaisu löydettävä tarkkuudella δ :

Lasketaan $x_0, x_1, x_2, \dots$ (jollain tavalla) ja lopetetaan kun

$$f(x_n - \delta)f(x_n + \delta) < 0$$

tai kun joko $f(x_n - \delta)f(x_n) < 0$ tai $f(x_n)f(x_n + \delta) < 0$

TAYLORIN POLYNOMIT

$f(x) = O(g(x)) \Rightarrow$ on olemassa vakio C s.e. $|f(x)| \leq C|g(x)|$
kun $x \in (a, b)$ tai $|x - x_0|$ on ”riittävän pieni”

$$\begin{aligned} f(x) &= O(f(x)) \\ f(x)O(g(x)) &= O(f(x)g(x)) \\ \frac{O(g(x))}{f(x)} &= O\left(\frac{g(x)}{f(x)}\right) \\ f(x) = O(g(x)) &\Rightarrow O(f(x)) + O(g(x)) = O(g(x)) \\ f(x) = O(g(x)) &\Rightarrow O(f(x) + g(x)) = O(g(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \\ &\quad \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{f^{(k+1)}(t)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1}, \\ &\quad (t-a)(x-t) > 0 \text{ eli } t \text{ on } a\text{:n ja } x\text{:n välillä} \\ &\quad \text{Tässä siis lauseke } f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \\ &\quad \text{on funktion } f \text{ astetta } k \text{ oleva Taylorin polynomi pisteessä } x = a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^k}{k!} + O(x^{k+1}) \\ \sin(x) &= x - \frac{x^3}{6} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + O(x^{2n+3}) \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + O(x^{2n+2}) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + O(x^{k+1}) \end{aligned}$$

Taylorin kehitelmän yksikäsitteisyys:

Jos f on $k+1$ kertaa derivoituva ja

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots + c_k(x-a)^k + O((x-a)^{k+1}) \\ \text{niin } c_0 &= f(a), \quad c_1 = f'(a), \quad c_2 = \frac{f''(a)}{2!}, \quad \dots \quad c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \end{aligned}$$

RAJA-ARVOJEN LASKEMINEN

l'Hopitalin sääntö I

Jos f ja g ovat derivoituvia, $f(a) = g(a) = 0$, $g'(x) \neq 0$ kun $x \neq a$ ja

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

$L \in [-\infty, \infty]$ ja a :n paikalla voi olla $b+$, $b-$, $-\infty$ tai $+\infty$

l'Hopitalin sääntö II

Jos f ja g ovat derivoituvia, $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$, $g'(x) \neq 0$ kun $x \neq a$ ja

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

$L \in [-\infty, \infty]$ ja a :n paikalla voi olla $b+$, $b-$, $-\infty$ tai $+\infty$

INTEGRAALIT

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

Integraalin $\int_a^b f(x) \, dx$ määritelmä:

Oletetaan: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ rajoitettu ($\sup\{|f(x)| \mid x \in [a, b]\} < \infty$) ja $-\infty < a < b < \infty$

$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ on välin $[a, b]$ jako jos $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

Alasumma: $L(f, P) = \sum_{j=1}^n f_j(x_j - x_{j-1})$ missä $f_j = \inf\{f(x) \mid x_{j-1} \leq x \leq x_j\}$

Yläsumma: $U(f, P) = \sum_{j=1}^n F_j(x_j - x_{j-1})$ missä $F_j = \sup\{f(x) \mid x_{j-1} \leq x \leq x_j\}$

Nyt f on integroituva välillä $[a, b]$ ja $\int_a^b f(x) \, dx = I$ jos

$\sup\{L(f, P) \mid P \text{ on välin } [a, b] \text{ jako}\} = \inf\{U(f, P) \mid P \text{ on välin } [a, b] \text{ jako}\} = I$

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ on integroituva välillä $[a, b]$ ainakin jos f on paloittain jatkuva (erikoisesti jatkuva) tai f on ei-vähenevä (tai ei-kasvava) välillä $[a, b]$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \, dx &= - \int_b^a f(x) \, dx \\ \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx &= \int_a^c f(x) \, dx \\ \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dx &= \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx \\ f(x) \leq g(x), \quad x \in [a, b], \quad (a < b) &\Rightarrow \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx \\ \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| &\leq \int_a^b |f(x)| \, dx, \quad a < b \end{aligned}$$

$$\int_a^b c \, dx = c(b - a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \, dt = f(x)$$

$$\int_a^b f'(x) \, dx = \int_a^b f(x) = f(b) - f(a)$$